
CAPÍTULOS ESPECIAIS

A LISTA DAS AVES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

José Eduardo Simon^{1,2}

¹FAESA – Campus II - Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. Vitória, ES. Brasil. CEP 29030-001. E-mail: simon@ebr.com.br

² Museu de Biologia Mello Leitão - MBML. Santa Teresa, ES. CEP: 29.650-000.

Introdução

Com extensão de 8.531.506 km², o Brasil é o quinto maior país do mundo, ocupando nada menos do que 47% de todo o continente sul americano. O seu número de espécies de aves coloca este país entre os mais ricos em diversidade do mundo. Recentemente, a lista de sua avifauna foi restabelecida em 1.822 espécies, após seis revisões do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO 2008).

O constante avanço das pesquisas em nosso país contribuiu para que a maioria dos estados brasileiros já possua a lista de suas aves, chamando a atenção para o fato de que os estudos regionais encontram-se em consonância na difusão do conhecimento científico. As unidades da federação para as quais tal informação foi publicada incluem, por exemplo, Amapá (Novaes 1974, 1978), Bahia (Souza 1995), Espírito Santo (Ruschi, 1953, 1967), Maranhão (Oren, 1991), Minas Gerais (Mattos *et al.* 1993), Paraná (Scherer-Neto e Straube 1995), Rio de Janeiro (Sick e Pabst 1968), Rio Grande Sul (Bencke 2001) e São Paulo (Willis e Oniki 2003).

Sejam elas de caráter abrangente ou pontual, as listas de aves, quando devidamente confeccionadas, contribuem para o refinamento das informações sobre a área de ocorrência dos táxons abordados (e.g. Argel-de-Oliveira 1996). Assim sendo, elas podem auxiliar no planejamento de expedições de coleta de material para estudos taxonômicos, apoiar análises sobre padrões de distribuição geográfica, subsidiar a identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, entre outras contribuições de cunho científico e conservacionista. Além disso, tais listas consistem em ferramentas úteis para o fortalecimento do turismo especializado, através da promoção de grupos de observadores de aves, atividade esta entendida como uma prática saudável e educativa para adeptos de diferentes faixas etárias.

O Espírito Santo foi um dos primeiros estados do sudeste brasileiro a possuir a lista de aves que ocorrem em seu território, em função dos trabalhos do naturalista Augusto Ruschi (Ruschi 1953, 1967). À época, a Ornitologia Brasileira encontrava-se em seu estágio incipiente, pois conduzia-se sob a tutela de pouquíssimos pesquisadores, munidos de raras fontes bibliográficas e escassos recursos tecnológicos à disposição. Somente mais tarde, ganharia outra dimensão, podendo a abrangente e didática obra de Helmut Sick, lançada em 1985 (Sick 1985), ser considerada o divisor de águas da Ornitologia Brasileira. Certamente, esse clássico da literatura desencadeou a formação de novas gerações de ornitólogos, hoje atuando em várias instituições de ensino, pesquisa e gestão ambiental do país. Entretanto, isso não significa que a nossa ornitologia já tenha alcançado a maturidade desejável (veja Raposo *et al.*, nesse livro).

A atuação de Augusto Ruschi nas décadas de 30 a 80 do século passado foi vital para o impulso da ornitologia capixaba. Além de sua extensa obra dedicada à avifauna regional,

especialmente sobre os troquilídeos, Augusto Ruschi, fundou, em 1949, o Museu de Biologia Mello Leitão (Santa Teresa), que abriga o mais importante acervo ornitológico coletado no Espírito Santo. Dos mais de 7.400 espécimes (procedentes também de outras regiões do Brasil e do exterior), quase 2.000 são beija-flores, os quais foram revisados e citados no Catálogo dos Troquilídeos do Museu de Biologia Mello Leitão, de autoria de Jacques Vielliard (Vielliard 1994). Logo no início de suas atividades, Ruschi publicou a primeira lista das aves do Espírito Santo (Ruschi 1953), a qual foi por ele revisada 14 anos depois (Ruschi 1967). Em função, contudo, da fragilidade verificada em algumas de suas publicações, suas análises sobre a composição da avifauna regional foram vistas com reservas pela comunidade científica (e.g. Sick 1997, Pacheco e Bauer 2001, Simon 2000, Willis e Oniki 2002).

O presente trabalho divulga uma versão atualizada da lista das aves silvestres até o momento assinaladas no Estado do Espírito Santo. A lista aqui apresentada não tem o objetivo de esgotar o assunto, mas sim o interesse em fornecer uma visão ampla e sistematizada da diversidade de aves que se distribui pelo território capixaba. Seu intuito maior é o de incentivar novas pesquisas, em vista da demanda de informações cada vez mais prementes para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.

Bases metodológicas para a confecção da lista

A inclusão das espécies em nossa lista fundamentou-se na compilação de três principais fontes de registros, a saber:

1) bibliografias especializadas, submetidas à revisão crítica das obras referenciais sobre o assunto, periódicos científicos e resumos apresentados nos congressos brasileiros de ornitologia (1991 a 2008);

2) espécimes existentes nas seguintes coleções científicas: Museu de Biologia Mello Leitão, Museu Nacional, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Museu de História Natural de Belo Horizonte e Museu de Zoologia João Moojen de Oliveira da Universidade Federal de Viçosa;

3) pesquisas de campo do autor, dedicadas ao conhecimento continuado da avifauna regional, abrangendo várias localidades e fitofisionomias do Espírito Santo, durante os últimos 12 anos (1997-2008) (por exemplo, Simon 2000, Simon *et al.* 2005, Ruschi e Simon 2007, Simon 2007, Simon *et al.* 2007a, Simon *et al.* 2008).

Durante a compilação dos registros mencionados, todas as diferentes ordens de aves foram consideradas, contemplando as espécies oceânicas, as limícolas e as continentais.

A divulgação completa das dezenas de referências bibliográficas que embasaram a confecção da presente lista fugiu ao escopo do presente trabalho, pois trata-se de uma análise sintética para o Livro de Resumos do XVII CBO. Optou-se por mencionar aqui alguns trabalhos que possam orientar o leitor na busca de informações gerais sobre a composição da avifauna regional, de acordo com os municípios melhor amostrados: Guarapari (Venturini *et al.* 1996), Domingos Martins (Bauer 1999), Linhares (Stotz 1993, Parker III & Goerck 1997, Marsden *et al.* 2001), Santa Maria de Jetibá (Venturini *et al.* 2000), Santa Teresa (Simon 2006, Willis & Oniki 2002) e Vitória (Simon *et al.* 2007a).

Embora as listas de aves fornecidas por Augusto Ruschi não tenham sido incorporadas ao presente estudo, sua obra magna - intitulada “Beija-flores do Estado do Espírito Santo” (Ruschi 1982) - ofereceu substancial suporte no que tange à troquilifauna regional.

A seqüência sistemática e a nomenclatura científico-popular (português/inglês) seguem a lista primária das aves do Brasil, organizada pelo Comitê Brasileiro de Registros

Ornitológicos (CBRO 2008). O *status* de ocorrência no Brasil também foi citado segundo as convenções do CBRO (2008), a saber: R- residente (evidências de reprodução no país disponíveis); VS- visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN- visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VA- vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; VA (S)- pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul; E- espécie endêmica do Brasil; # - status presumido mas não confirmado.

O estudo de Parker III *et al.* (1996), combinado com Sick (1997), serviu de base para a citação das espécies associadas ao ambiente florestal, aqui considerado em suas diferentes tipologias: mangue (estrutura arbórea), mata de restinga, mata de tabuleiro, mata estacional semidecidual, mata de encosta e mata altimontana (para detalhes sobre as formações florestais no Espírito Santo, recomenda-se: Ruschi 1950, Garay *et al.* 2004, Almeida e Vale 2007, Assis *et al.* 2007, Magnago *et al.* 2007, Almeida 2007, Assis 2007, Pereira 2007 e Simonelli 2007).

A menção ao *status* de conservação das espécies seguiu o Livro Vermelho da Fauna Brasileira ameaçada de Extinção (Lista Nacional: MMA 2008) e a lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo (Lista Estadual: Simon *et al.* 2007b), de acordo com as seguintes categorias de ameaça: CP ou CR- criticamente em perigo; EP ou EN- em perigo; VU- vulnerável; RE- regionalmente extinta.

As aves endêmicas do bioma Mata Atlântica foram citadas segundo PARKER III *et al.* (1996), considerando as atualizações taxonômicas dos últimos anos (CBRO 2008). A menção às espécies submetidas à pressão de caça (aves cinegéticas) e de captura para cativeiro (xerimbabos) apoiou-se na literatura (e.g. Sick 1997) e em entrevistas com ex-caçadores e experientes passarinheiros de vários municípios (Santa Teresa, Linhares, Colatina, Conceição da Barra, etc).

Em decorrência da i) histórica e contínua degradação da Mata Atlântica, ii) da carência de dados sobre a distribuição pretérita de sua avifauna e iii) da prática de solturas deliberadas de espécimes cativos, é difícil precisar (ou mesmo estimar) quais são as espécies genuinamente exóticas (= alóctones) e a época em que as mesmas se estabeleceram no Espírito Santo. Sendo assim, a citação das espécies exóticas na presente lista figura-se apenas como uma tentativa preliminar em discriminá-las na composição da avifauna catalogada em seu território. Basicamente, tal tarefa apoiou-se na consulta à literatura para obtenção de informações sobre a área original de ocorrência das aves potencialmente exóticas e na revisão cronológica dos registros de levantamentos pretéritos e atuais, sejam eles procedentes da literatura ou coleções científicas. Por vezes, aves como *Eudocimus ruber* (guarda), *Numida meleagris* (galinha-d'angola), *Amazona aestiva* (papagaio-verdeadeiro) e *Ramphastos toco* (tucanuçu), tem sido ocasionalmente avistadas em liberdade no Espírito Santo (Parker III e Goerck 1997, Pacheco e Bauer 2001, Simon *et al.* 2004, J.E.Simon obs. pess.). Contudo, tais espécies não foram inseridas à presente lista, por suspeita de que tais registros referem-se a alguns indivíduos procedentes de cativeiro, associada à falta de confirmação de que as mesmas tenham estabelecido populações na natureza, em concordância com o que é praticado na Ornitologia Brasileira (*cf.* Sick 1997). Com efeito, a lista aqui apresentada reporta-se apenas às aves silvestres, isto é, às espécies autóctones e às alóctones devidamente confirmadas para o território capixaba.

Apresentação da Lista das Aves do Estado do Espírito Santo

Com base nas três fontes de dados consultadas, 654 espécies tiveram a sua ocorrência confirmada para o território do Espírito Santo (Tabela 1). Desse total, 39 estão citadas na

lista nacional da fauna ameaçada de extinção, sete das quais sob o *status* de criticamente em perigo (CR): *Puffinus lherminieri* (pardela-de-asa-larga), *Fregata minor* (tesourão-grande), *Fregata ariel* (tesourão-pequeno), *Claravis goedefrida* (pararu-espelho), *Neomorphus geoffroyi* (jacu-estalo), *Nemosia rourei* (saíra-apunhalada), *Sporophila maximiliani* (bicudo); enquanto 85 estão citadas na lista estadual, quatro das quais admitidas como regionalmente extintas: *Aburria jacutinga* (jacutinga), *Mesembrinibis cayennensis* (coro-coró), *Ara chloropterus* (arara-vermelha-grande) e *Sporophila maximiliani* (bicudo). O cuculídeo *Neomorphus geoffroyi dulcis* (jacu-estalo), eleita a ave-símbolo do XVII CBO, encontra-se sob o *status* de criticamente em perigo (CR/CP) tanto em escala regional como nacional.

Entre as aves não-passeriformes, Trochilidae destaca-se como a família de maior riqueza específica, representada por 38 espécies, quatro das quais sob algum grau de ameaça: *Ramphodon naevius* (beija-flor-rajado, EP), *Glaucis dohrnii* (balança-rabo-canela, EN/CP), *Phaethornis margaretae* (rabo-branco-de-margarette, EN/CP) e *Discosura langsdorffi* (rabo-de-espinho, VU/CP). Outro destaque é para a família Psittacidae, pois de suas 22 espécies, 11 (50%) estão ameaçadas de extinção, além de uma regionalmente extinta (*Ara chloropterus*, arara-vermelha-grande).

A maior expressividade numérica entre aves passeriformes ocorre em Tyrannidae, representada por 83 espécies, entre elas, quatro ameaçadas de extinção no Espírito Santo: *Corythopis delalandi* (estalador), *Rhynchocyclus olivaceus* (bico-chato-grande), *Platyrinchus leucoryphus* (patinho-gigante) e *Attila spadiceus* (capitão-de-saíra-amarelo). Aqui, também merece destaque a família Cotingidae, pois nada menos do que cinco de suas 10 espécies estão em vias de extinção: *Phibalura flavirostris* (tesourinha-da-mata), *Carpornis melanocephala* (sabiá-pimenta), *Cotinga maculata* (crejoá), *Lipaugus vociferans* (crició) e *Xipholena atropurpurea* (anambé-de-asa-branca).

Ainda no que se refere ao total assumido para o Espírito Santo, 355 são espécies florestais; 139 são endêmicas do bioma Mata Atlântica; 27 são exóticas; e 78 são espécies sob pressão de caça (25 spp.) e captura (54 spp.). Entre as exóticas (alóctones), várias muito provavelmente são decorrentes da perda do ambiente florestal pelo avanço das fronteiras agrícolas, a exemplo de *Rhynchotus rufescens* (perdiz), *Nothura boraquira* (codorna-do-nordeste), *Cariama cristata* (seriema), *Amazilia leucogaster* (beija-flor-de-barriga-branca) e *Anumbius annumbi* (cochicho); enquanto outras devem estar ou estão relacionadas à soltura deliberada de espécimes procedentes do cativeiro, como *Ara ararauna* (arara-canindé), *Columba livia* (pombo-doméstico), *Sporophila albogularis* (golinho), *Estrilda astrild* (bico-de-lacre) e *Passer domesticus* (pardal). Entre as espécies submetidas à pressão de caça/captura no Espírito Santo, três estão regionalmente extintas: *Aburria jacutinga* (jacutinga), *Ara chloropterus* (arara-vermelha-grande) e *Sporophila maximiliani* (bicudo).

E quanto ao *status* de ocorrência sazonal no Brasil, 24 espécies são visitantes oriundas do hemisfério norte (VN), a exemplo de *Falco peregrinus* (falcão peregrino), *Arenaria interpres* (vira-pedras), *Coccyzus americanus* (papa-lagarta-de-asa-vermelha), *Contopus cooperi* (piui-boreal) e *Dendroica striata* (mariquita-de-perna-clara); 11 são visitantes oriundas do hemisfério sul (VS), a exemplo de *Spheniscus magellanicus* (pingüim-de-magalhães); *Daption capense* (pomba-do-cabo), *Procellaria aequinoctialis* (pardela-preta) e *Oceanites oceanicus* (alma-de-mestre); e duas, *Pachyptila vittata* (faigão-de-bico-largo) e *Phytotoma rutila* (corta-ramos), enquadram-se como vagantes oriundos do sul (VA-S).

Tabela 1- Lista das aves do Estado do Espírito Santo, fundamentada na compilação e revisão crítica de três fontes principais de registros: literatura científica, coleções ornitológicas e inventários de campo do autor nos últimos 12 anos (1997-2008).

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Ordem Tinamiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Tinamidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819) <i>Crypturellus soui</i> (Hermann, 1783) <i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815) <i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied, 1820) <i>Crypturellus variegatus</i> (Gmelin, 1789) <i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827) <i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815) <i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815) <i>Nothura horacquira</i> (Spix, 1825) <i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815) | macuco tururim inhambuiguacu jaó-do-sul inhambu-anhangá inhambu-chororó inhambu-chintá perdiz codorna-do-nordeste codorna-amarela | Solitary Tinamou Little Tinamou Brown Tinamou Yellow-legged Tinamou Variegated Tinamou Small-billed Tinamou Tataupa Tinamou Red-winged Tinamou White-bellied Nothura Spotted Nothura | R R R, E R R R R R R | CP VU CP EP | x x x x x x x x x | x x x x x x x x x | x x x x x x x x x | c c c c c c c c c |
| Ordem Anseriformes | | | | | | | | |
| <i>Família Anhimidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766) | anhumá | Horned Screamer | R | | | | x | |
| <i>Família Anatidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758) <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789) <i>Anas bahamensis</i> Linnaeus, 1758 <i>Nomonyx dominica</i> (Linnaeus, 1766) | ireé asa-branca pato-do-mato pé-vermelho marreca-toicinho marreca-de-bico-roxo | White-faced Whistling-Duck Black-bellied Whistling-Duck Muscovy Duck Brazilian Teal White-cheeked Pintail Masked Duck | R R R R R R | | | | c c | |
| Ordem Galliformes | | | | | | | | |
| <i>Família Cracidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ortalis guttata</i> (Spix, 1825) <i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815 <i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815 <i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825) <i>Crax blumenbachii</i> Spix, 1825 | aracuã jacupemba jacuacu jacutinga mutum-de-bico-vermelho | Speckled Chachalaca Rusty-margined Guan Dusky-legged Guan Black-fronted Piping-Guan Red-billed Curassow | R R R R, E R, E | | | | VU RE CP | |
| <i>Família Odontophoridae</i> | | | | | | | | |
| <i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825) | uru | Spot-winged Wood-Quail | R | | | | EP | x |
| | | | | | | | | c |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica ou Xerimbabo |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Ordem Podicipediformes | | | | | | | |
| <i>Família Podicipedidae</i> | | | | | | | |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766) | mergulhão-pequeno | Least Grebe | R | | | | |
| <i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758) | mergulhão-caçador | Pied-billed Grebe | R | | | | |
| <i>Podicephorus major</i> (Boddaert, 1783) | mergulhão-grande | Great Grebe | R | | | | |
| Ordem Sphenisciformes | | | | | | | |
| <i>Família Spheniscidae</i> | | | | | | | |
| <i>Spheniscus magellanicus</i> (Forster, 1781) | pinguim-de-magalhães | Magellanic Penguin | VS | | | | |
| Ordem Procellariiformes | | | | | | | |
| <i>Família Diomedeidae</i> | | | | | | | |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789) | albatroz-de-nariz-amarelo | Yellow-nosed Albatross | VS | VU | | | |
| <i>Thalassarche melanophris</i> (Temminck, 1828) | albatroz-de-sobrancelha | Black-browed Albatross | VS | VU | | | |
| <i>Família Procellariidae</i> | | | | | | | |
| <i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789) | petrel-gigante | Southern Giant-Petrel | VS | | | | |
| <i>Daption capense</i> (Linnaeus, 1758) | pomba-do-cabo | Cape Petrel | VS | | | | |
| <i>Pterodroma ammodytana</i> (Giglioli & Salvadori, 1869) | grazina-de-trindade | Herald Petrel | R | | | | |
| <i>Pachyptila vittata</i> (Forster, 1777) | faigão-de-bico-largo | Broad-billed Prion | VA (S) | | | | |
| <i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758 | pardela-preta | White-chinned Petrel | VS | VU | | | |
| <i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844 | pardela-de-óculos | Spectacled Petrel | VS | EN | | | |
| <i>Puffinus gravis</i> (O'Reilly, 1818) | bobo-grande | Greater Shearwater | VS | | | | |
| <i>Puffinus lherminieri</i> Lesson, 1839 | -de-sobre-branco | Audubon's Shearwater | R | CR | CP | | |
| <i>Família Hydrobatidae</i> | | | | | | | |
| <i>Fregata grallaria</i> (Vieillot, 1818) | páinho-de-barriga-branca | White-bellied Storm-Petrel | VS | | | | |
| <i>Oceanites oceanicus</i> (Kuhl, 1820) | alma-de-mestre | Wilson's Storm-Petrel | VS | | | | |
| <i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot, 1818) | páinho-de-cauda-furcada | Leach's Storm-Petrel | VN | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica ou Xerimbabo |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Ordem Pelecaniformes | | | | | | | |
| <i>Família Sulidae</i> | | | | | | | |
| <i>Sula dactylatra</i> Lesson, 1831 | atobá-grande | Masked Booby | R | | | | |
| <i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766) | atobá-de-pé-vermelho | Red-footed Booby | R | | | | |
| <i>Sula leucogaster</i> (Boddart, 1783) | atobá-pardo | Brown Booby | R | | | | |
| <i>Família Phalacrocoracidae</i> | | | | | | | |
| <i>Phalacrocorax brasiliensis</i> (Gmelin, 1789) | biguá | Neotropic Cormorant | R | | | | |
| <i>Família Anhingidae</i> | | | | | | | |
| <i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766) | biquatinga | Anhinga | R | | | | |
| <i>Família Fregatidae</i> | | | | | | | |
| <i>Fregata magnificens</i> Mathews, 1914 | tesourão | Magnificent Frigatebird | R | | | | |
| <i>Fregata minor</i> (Gmelin, 1789) | tesourão-grande | Great Frigatebird | R# | | | | |
| <i>Fregata ariel</i> (Gray, 1845) | tesourão-pequeno | Lesser Frigatebird | R# | | | | |
| Ordem Ciconiformes | | | | | | | |
| <i>Família Ardeidae</i> | | | | | | | |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddart, 1783) | socó-boi | Rufescent Tiger-Heron | R | | | | |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> (Linnaeus, 1766) | arapapá | Boat-billed Heron | R | | | | |
| <i>Botaurus pinnatus</i> (Wagler, 1829) | socó-boi-baio | Pinnated Bittern | R | | | | |
| <i>Ixobrychus exilis</i> (Gmelin, 1789) | soco-vermelho | Least Bittern | R | | | | |
| <i>Ixobrychus involucris</i> (Weiellot, 1823) | soco-amarelo | Stripe-backed Bittern | R | | | | |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | savacu | Black-crowned Night-Heron | R | | | | |
| <i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758) | savacu-de-coroa | Yellow-crowned Night-Heron | R | | | | |
| <i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758) | socoziinho | Striated Heron | R | | | | |
| <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | garça-vaqueira | Cattle Egret | R | | | | |
| <i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766 | garça-moura | CocoI Heron | R | | | | |
| <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | garça-branca-grande | Great Egret | R | | | | |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824) | maria-faceira | Whistling Heron | R | | | | |
| <i>Pilherodius pileatus</i> (Boddart, 1783) | garça-real | Capped Heron | R | | | | |
| <i>Egretta thula</i> (Molina, 1782) | garça-branca-pequena | Snowy Egret | R | | | | |
| <i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758) | garça-azul | Little Blue Heron | R | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Especie Endêmica (Mata Atlântica) | Especie Exótica | Especie Cinereética ou Xerimbarabo |
|--|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <i>Família Threskiornithidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | cord-córo colhereiro | Green Ibis Roseate Spoonbill | R R | | | | | |
| <i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | | |
| <i>Família Ciconiidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789) | maguari tuiuú | Maguari Stork Jabiru | R R | | | | | |
| <i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819) | | | | | | | | |
| Ordem Cathartiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Cathartidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-de-cabeça-vermelha | Turkey Vulture | R | | | | | |
| <i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845 | urubu-de-cabeça-amarela | Lesser Yellow-headed Vulture | R | | | | | |
| <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793) | urubu-de-cabeça-preta | Black Vulture | R | | | | | |
| <i>Sarcophampus papa</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-rei | King Vulture | R | | | | | |
| Ordem Falconiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Pandionidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | água-pescadora | Owl | VN | | | | | |
| <i>Família Accipitridae</i> | | | | | | | | |
| <i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790) | gavião-de-cabeça-cinza | Gray-headed Kite | R | | | | | |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> (Temminck, 1822) | carao-leiro | Hook-billed Kite | R | | | | | |
| <i>Elanioides forficatus</i> (Linnaeus, 1758) | gavião-tesoura | Swallow-tailed Kite | R | | | | | |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i> Vigors, 1825 | gavião-ozinho | Pearl Kite | R | | | | | |
| <i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818) | gavião-peneira | White-tailed Kite | R | | | | | |
| <i>Rostrohamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817) | gavião-caramujeiro | Snail Kite | R | | | | | |
| <i>Harpagus bidens</i> (Latham, 1790) | gavião-ripiña | Double-toothed Kite | R | | | | | |
| <i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823) | gavião-bombachinha | Rufous-thighed Kite | R | | | | | |
| <i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788) | sovi | Plumbeous Kite | R | | | | | |
| <i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788) | gavião-do-banhado | Long-winged Harrier | R | | | | | |
| <i>Accipiter poliocephalus</i> (Temminck, 1824) | tauá-pintado | Gray-bellied Goshawk | R | | | | | |
| <i>Accipiter superciliosus</i> (Linnaeus, 1766) | gavião-miudinho | Tiny Hawk | R | | | | | |
| <i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808 | gavião-miúdo | Sharp-shinned Hawk | R | | | | | |
| <i>Accipiter bicolor</i> (Vieillot, 1817) | gavião-bombachinha grande | Bicolored Hawk | R | | | | | |
| <i>Geranospiza caerulescens</i> (Vieillot, 1817) | gavião-pernilongo | Crane Hawk | R | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Leucopternis lacernulatus</i> (Temminck, 1827) | gavião-pombo-pequeno | White-necked Hawk | R, E | VU | | x | | x | |
| <i>Leucopternis polionotus</i> (Kaup, 1847) | gavião-pombo-grande | Mantled Hawk | R | VU | | x | | x | |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> (Gmelin, 1788) | gavião-preto | Great Black-Hawk | R | | | | | | |
| <i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790) | gavião-caboclo | Savanna Hawk | R | | | | | | |
| <i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790) | gavião-bele | Black-collared Hawk | R | | | | | | |
| <i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824) | gavião-asas-de-telha | Harris' Hawk | R | | | | | | |
| <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) | gavião-carijó | Roadside Hawk | R | | | | | | |
| <i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816 | gavião-de-rabo-branco | White-tailed Hawk | R | | | | | | |
| <i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816 | gavião-de-cauda-curta | Short-tailed Hawk | R | | | | | | |
| <i>Buteo albonotatus</i> Kaup, 1847 | gavião-de-rabo-barrado | Zone-tailed Hawk | R | | | | | | |
| <i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800) | uiracu-falso | Crested Eagle | R | | | | | | |
| <i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758) | gavião-real | Harpy Eagle | R | | | | | | |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied, 1820) | gavião-pega-macaco | Black Hawk-Eagle | R | | | | | | |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1816) | gavião-nato | Black-and-white Hawk-Eagle | R | | | | | | |
| <i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800) | gavião-de-penacho | Ornate Hawk-Eagle | R | | | | | | |
| <i>Família Falconidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777) | caracará | Southern Caracara | R | | | | | | |
| <i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816) | carrapateiro | Yellow-headed Caracara | R | | | | | | |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758) | acauã | Laughing Falcon | R | | | | | | |
| <i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817) | falcão-cabré | Barred Forest-Falcon | R | | | | | | |
| <i>Micrastur gilvicollis</i> (Vieillot, 1817) | falcão-mateiro | Lined Forest-Falcon | R | | | | | | |
| <i>Micrastur mirandolii</i> (Schlegel), 1862 | tanatau | Slaty-backed Forest-Falcon | R | | | | | | |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817) | falcão-relógio | Collared Forest-Falcon | R | | | | | | |
| <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758 | quiriquiri | American Kestrel | R | | | | | | |
| <i>Falco tifugularis</i> Daudin, 1800 | cauré | Bat Falcon | R | | | | | | |
| <i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825 | falcão-de-peito-laranja | Orange-breasted Falcon | R | | | | | | |
| <i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822 | falcão-de-coleira | Plomated Falcon | R | | | | | | |
| <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | falcão-peregrino | Peregrine Falcon | VN | | | | | | |
| Ordem Gruiformes | | | | | | | | | |
| <i>Família Aramidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766) | carão | Limpkin | R | | | | | | |
| <i>Família Rallidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Rallus longirostris</i> Boddaert, 1783 | saracura-matracá | Clapper Rail | R | | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbaço |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Aramides mangle</i> (Spix, 1825) <i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776) <i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825) <i>Amaurodramus concolor</i> (Gosse, 1847) <i>Lateralis viridis</i> (Statius Muller, 1776) <i>Lateralis melanophaius</i> (Vieillot, 1819) <i>Lateralis exilis</i> (Temminck, 1831) <i>Porzana flaviventer</i> (Boddaert, 1783) <i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819) <i>Neocrex erythrops</i> (Sciater, 1867) <i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783) <i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819) <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766) | saracura-do-mangue saracura-três-potes saracura-do-mato saracura-lisa sanã-castanha sanã-parda sanã-do-capim sanã-anarela sanã-carijó turu-turu saracura-carijó saracura-sanã frango-d'água-comum frango-d'água-azul | Little Wood-Rail Gray-necked Wood-Rail Slaty-breasted Wood-Rail Uniform Crake Russet-crowned Crake Rufous-sided Crake Gray-breasted Crake Yellow-breasted Crake Ash-throated Crake Paint-billed Crake Spotted Rail Blackish Rail Common Moorhen Purple Gallinule | R, E | | | x | x | x | c c |
| <i>Heliornis fulica</i> (Boddaert, 1783) | picaparra | Sungrebe | R | | | | | | |
| <i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766) | seriema | Red-legged Seriema | R | | | | | | x |
| Ordem Charadriiformes | | | | | | | | | |
| <i>Família Charadriidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vanellus cayanus</i> (Latham, 1790) <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) <i>Pluvialis dominica</i> (Statius Muller, 1776) <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) <i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825 <i>Charadrius collaris</i> Vieillot, 1818 | batuíra-de-esporão quero-quero batuirucu batuiruçu-de-axila-preta batuirá-de-hando batuirá-de-coleira | Pied Lapwing Southern Lapwing American Golden-Plover Black-bellied Plover Semipalmated Plover Collared Plover | R R VN VN VN R | | | | | | |
| <i>Família Haematopodidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Haematopus palliatus</i> Temminck, 1820 | piru-piru | American Oystercatcher | R | | | | | | |
| <i>Família Recurvirostridae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817 | pemilongo-de-costas-brancas | White-backed Stilt | R | | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Família Scolopacidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Gallinago paraguaiae</i> (Vieillot, 1816) | narceja | South American Snipe | R | | | | | |
| <i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783) | narcejão | Giant Snipe | R | | | | | |
| <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | maçarico-galego | Whimbrel | VN | | | | | |
| <i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766) | maçarico-pintado | Spotted Sandpiper | VN | | | | | |
| <i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813 | maçarico-solitário | Solitary Sandpiper | VN | | | | | |
| <i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-grande -de-perna-amarela | Greater Yellowlegs | VN | | | | | |
| <i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789) | maçarico-de-perna-amarela | Lesser Yellowlegs | VN | | | | | |
| <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | vira-pedras | Ruddy Turnstone | VN | | | | | |
| <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | maçarico-branco | Sanderling | VN | | | | | |
| <i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766) | maçarico-rasteirinho | Semipalmated Sandpiper | VN | | | | | |
| <i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819) | maçarico-de-sobre-branco | White-rumped Sandpiper | VN | | | | | |
| <i>Família Jacanidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766) | jacanã | Wattled Jacana | R | | | | | |
| <i>Família Stercorariidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758) | mandrião-parasítico | Parasitic Jaeger | VN | | | | | |
| <i>Família Laridae</i> | | | | | | | | |
| <i>Larus dominicanus</i> Lichtenstein, 1823 | gáivotão | Kelp Gull | R | | | | | |
| <i>Família Sternidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758) | trinta-reis-escuro | Brown Noddy | R | | | | | |
| <i>Anous minutus</i> Boie, 1844 | trinta-reis-preto | Black Noddy | R | | | | | |
| <i>Gygis alba</i> (Sparmann, 1786) | grazina | White Tern | R | | | | | |
| <i>Phaetusa simplex</i> (Gmelin, 1789) | trinta-reis-grande | Large-billed Tern | R | | | | | |
| <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | trinta-reis-horeal | Common Tern | VN | | | | | |
| <i>Sterna hirundinacea</i> Lesson, 1831 | trinta-reis-de-bico-vermelho | South American Tern | R | | | | | |
| <i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787) | trinta-reis-de-bando | Sandwich Tern | R | | | | | |
| <i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783) | trinta-reis-real | Royal Tern | R | | | | | |
| <i>Família Rynchopidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Rynchops niger</i> Linnaeus, 1758 | talha-mar | Black Skimmer | R | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Especie Florestal | Especie Endêmica (Mata Atlântica) | Especie Exótica | Espécie Ginegética ou ou Xerimbabo |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Ordem Columbiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Columbidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766) | rolinha-de-asa-canelada | Plain-breasted Ground-Dove | R | | | | | |
| <i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811) | rolinha-roxa | Ruddy Ground-Dove | R | | | | | |
| <i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831) | fogo-apagou | Scaled Dove | R | | | | | |
| <i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813) | rolinha-picuí | Picui Ground-Dove | R | | | | | |
| <i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886) | pararú-azul | Blue Ground-Dove | R | | | | | |
| <i>Claravis godefrida</i> (Temminck, 1811) | pararú-espelho | Purple-winged Ground-Dove | R | | | | | |
| <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | pombo-doméstico | Rock Dove | R | | | | | |
| <i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789) | pomba-trocal | Scaled Pigeon | R | | | | | |
| <i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) | pomba | Picazzuro Pigeon | R | | | | | |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792) | pomba-galega | Pale-vented Pigeon | R | | | | | |
| <i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818) | pomba-amargosa | Plumbeous Pigeon | R | | | | | |
| <i>Zenaidura auriculata</i> (Des Murs, 1847) | pomba-de-bando | Eared Dove | R | | | | | |
| <i>Leptotila verreauxii</i> Bonaparte, 1855 | juriti-pupu | White-tipped Dove | R | | | | | |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792) | juriti-gemeadeira | Gray-fronted Dove | R | | | | | |
| <i>Geotrygon violacea</i> (Temminck, 1809) | juriti-vermelha | Violaceous Quail-Dove | R | | | | | |
| <i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758) | pariri | Ruddy Quail-Dove | R | | | | | |
| Ordem Psittaciformes | | | | | | | | |
| <i>Família Psittacidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ara ararauna</i> (Linnaeus, 1758) | arara-canindé | Blue-and-yellow Macaw | R | | | | | |
| <i>Ara chloropterus</i> Gray, 1859 | arara-vermelha-grande | Red-and-green Macaw | R | | | | | |
| <i>Primolius maracana</i> Vieillot, 1816) | maracanã-verdeadeira | Blue-winged Macaw | R | | | | | |
| <i>Diopsittaca nobilis</i> (Linnaeus, 1758) | maracanã-pequena | Red-shouldered Macaw | R | | | | | |
| <i>Aratinga leucophthalmia</i> (Statius Muller, 1776) | periquitão-maracanã | White-eyed Parakeet | R | | | | | |
| <i>Aratinga auricapillus</i> (Kuhl, 1820) | jandaia-de-testa-vermelha | Golden-capped Parakeet | R, E | | | | | |
| <i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788) | periquito-rei | Peach-fronted Parakeet | R | | | | | |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> (Wied, 1820) | tiriba-grande | Blue-throated Parakeet | R, E | | | | | |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817) | tiriba-de-testa-vermelha | Maroon-bellied Parakeet | R | | | | | |
| <i>Pyrrhura leucotis</i> (Kuhl, 1820) | tiriba-de-orelha-branca | Maroon-faced Parakeet | R, E | | | | | |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824) | tuim | Blue-winged Parrotlet | R | | | | | |
| <i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788) | periquito-rico | Plain Parakeet | R, E | | | | | |
| <i>Touit melanotus</i> (Wied, 1820) | apuim-de-costas-pretas | Brown-backed Parrotlet | R, E | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Touit surdus</i> (Kuhl, 1820) <i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769) <i>Pionus menstruus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820) <i>Amazona rhodocorytha</i> (Salvadori, 1890) <i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766) <i>Amazona farinosa</i> (Boddart, 1783) <i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820) <i>Trichilaria malachitacea</i> (Spix, 1824) | apuim-de-cauda-amarela cuiú-cuiú maitaca-de-cabeça-azul maitaca-verde chaúá curica papagaio-moleiro papagaio-de-peito-roxo sabiá-cíca | Golden-tailed Parrotlet Pileated Parrot Blue-headed Parrot Scaly-headed Parrot Red-browed Parrot Orange-winged Parrot Mealy Parrot Vineaceous Parrot Blue-bellied Parrot | R, E R R R R R R R, E | EP VU VU | EN | x x x x x x x x | x x | x x x x x x x x | |
| Ordem Cuculiformes | | | | | | | | | |
| <i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766) <i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817 <i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758) | alma-de-gato papa-lagarta-acanelado papa-lagarta-de-asa-vermelha papa-lagarta-de-euler papa-lagarta-de-conica anu-preto anu-branco saci peixe-frito-verde-olho jacu-estalo | Squirrel Cuckoo Dark-billed Cuckoo Yellow-billed Cuckoo Pearly-breasted Cuckoo Greater Ani Smooth-billed Ani Guira Cuckoo Striped Cuckoo Pheasant Cuckoo Rufous-vented Ground-Cuckoo | R R VN | R | CR | CP | x x x x x x x x | x x x x x x x x | |
| Ordem Strigiformes | | | | | | | | | |
| <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | coruja-da-igreja | Barn Owl | | R | | | | | |
| <i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817) <i>Megascops atricapilla</i> (Temminck, 1822) <i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790) <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (Bertoni & Bertoni, 1901) <i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788) | corujinha-do-mato corujinha-sapo murucututu murucututu-de -barriga-amarela jacurutu | Tropical Screech-Owl Black-capped Screech-Owl Spectacled Owl Tawny-browed Owl Great Horned Owl | R R R R | | | | x x x x | x x x x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbaço |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825 <i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849) <i>Strix huhula</i> Daudin, 1800 <i>Glaucidium minutissimum</i> (Wied, 1830) <i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788) <i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782) <i>Rhinoptynx clamator</i> (Vieillot, 1808) | coruja-listrada coruja-dô-mato coruja-preta caburé-miúinho caburé coruja-buraqueira coruja-orelhuda | Rusty-barred Owl Mottled Owl Black-banded Owl Least Pygmy-Owl Ferruginous Pygmy-Owl Burrowing Owl Striped Owl | R R R R R R R | VU EP | x | x | x | x |
| Ordem Caprimulgiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Nyctibiidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Nyctibius grandis</i> (Gmelin, 1789) <i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820) <i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789) | mãe-da-lua-gigante mãe-da-lua-parda mãe-da-lua | Great Potoo Large-tailed Potoo Common Potoo | R R R | VU VU | VU VU | | x | x |
| <i>Família Caprimulgidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789) <i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783) <i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771) <i>Podargus nacunda</i> (Vieillot, 1817) <i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789) <i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (Tschudi, 1844) <i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783 <i>Caprimulgus longirostris</i> Bonaparte, 1825 <i>Caprimulgus maculicaudus</i> (Lawrence, 1862) <i>Caprimulgus parvulus</i> Gould, 1837 <i>Caprimulgus hirundinaceus</i> Spix, 1825 <i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789) <i>Macropsalis forcipata</i> (Nitzsch, 1840) | tuju bacurau-de-asa-fina bacurau-norte-americano corução bacurau bacurau-ocelado joão-conta-pau bacurau-da-teixa bacurau-de-rabo-maculado bacurau-chintá bacurau-zinho-da-caatinga bacurau-tesoura bacurau-tesoura-gigante | Short-tailed Nighthawk Lesser Nighthawk Common Nighthawk Naucanda Nighthawk Pauraque Ocellated Poorwill Rufous Nightjar Band-winged Nightjar Spot-tailed Nightjar Little Nightjar Pygmy Nightjar Scissor-tailed Nightjar Long-trained Nightjar | R R VN R R R R R R R R R R | | x | | | |
| Ordem Apodiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Apodidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Cypseloides fumigatus</i> (Streubel, 1848) <i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826) <i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796) <i>Streptoprocne biscutata</i> (Slater, 1866) | taperucu-preto taperucu-velho taperucu-de-coleira-branca taperucu-de-coleira-falha | Sooty Swift Great Dusky Swift White-collared Swift Biscutate Swift | R R R R | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862 | andorinhão-de-sobre-cinzenzo | Gray-rumped Swift | R | | | x | | | |
| <i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907 | andorinhão-do-temporal | Sick's Swift | R | | | x | | | |
| <i>Panyptila cayennensis</i> (Gmelin, 1789) | andorinhão-estofador | Lesser Swallow-tailed Swift | R | | | x | | | |
| <i>Família Trochilidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ramphodon naevius</i> (Dumont, 1818) | beija-flor-rajado | Saw-billed Hermit | R, E | EN | | EP | x | x | x |
| <i>Glaucis dohnmii</i> (Bourcier & Mulsant, 1852) | balança-rabo-canela | Hook-billed Hermit | R, E | | | CP | x | x | x |
| <i>Glaucis hirsutus</i> (Gmelin, 1788) | balança-rabo-de-bico-torto | Rufous-breasted Hermit | R | | | | x | | |
| <i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822) | rabo-branco-pequeno | Dusky-throated Hermit | R, E | | | | x | | |
| <i>Phaethornis idaliae</i> (Bourcier & Mulsant, 1856) | rabo-branco-mirim | Minute Hermit | R, E | | | | x | | |
| <i>Phaethornis ruber</i> (Linnaeus, 1758) | rabo-branco-rubro | Reddish Hermit | R | | | | x | | |
| <i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839) | rabo-branco-acanelado | Planalto Hermit | R | | | | x | | |
| <i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832) | rabo-branco-de-garganta-rajada | Scale-throated Hermit | R | | | | x | | |
| <i>Phaethornis margaretae</i> Ruschi, 1972 | rabo-branco-de-margarete | Margareta's Hermit | R, E | | | | x | | |
| <i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-tesoura | Swallow-tailed Hummingbird | R | | | | x | | |
| <i>Aphantochroa cirochoris</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-cinza | Sombre Hummingbird | R | | | | x | | |
| <i>Florisuga mellivora</i> (Linnaeus, 1758) | beija-flor-azul-de-rabo-branco | White-necked Jacobin | R | | | | x | | |
| <i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817) | beija-flor-preto | Black Jacobin | R | | | | x | | |
| <i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816) | beija-flor-de-orelha-violeta | White-vented Violet-ear | R | | | | x | | |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817) | beija-flor-de-veste-preta | Black-throated Mango | R | | | | x | | |
| <i>Chrysocolaptes mosquitorius</i> (Linnaeus, 1758) | beija-flor-vermelho | Ruby-topaz Hummingbird | R | | | | x | | |
| <i>Stephanoxis islandia</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-topete | Plovercrest | R | | | | x | | |
| <i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817) | topetinho-vermelho | Frilled Coquette | R, E | | | | x | | |
| <i>Lophornis chalybeus</i> (Vieillot, 1822) | topetinho-verde | Festive Coquette | R | | | | x | | |
| <i>Discosura langsdorffii</i> (Temminck, 1821) | rabo-de-espinho | Black-hellied Thornbill | R | | | | x | | |
| <i>Discosura longicaudus</i> (Gmelin, 1788) | bandeirinha | Racket-tailed Coquette | R | | | | x | | |
| <i>Chlorestes notata</i> (Reich, 1793) | beija-flor-de-garganta-azul | Blue-chinned Sapphire | R | | | | x | | |
| <i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812) | besourinho-de-bico-vermelho | Glittering-bellied Emerald | R | | | | x | | |
| <i>Thalurania furcata</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-tesoura-verde | Fork-tailed Woodnymph | R | | | | x | | |
| <i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-de-fronte-violeta | Violet-capped Woodnymph | R | | | | x | | |
| <i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788) | beija-flor-safira | Rufous-throated Sapphire | R | | | | x | | |
| <i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-roxo | White-chinned Sapphire | R | | | | x | | |
| <i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818) | beija-flor-de-papo-branco | White-throated Hummingbird | R | | | | x | | |
| <i>Polymixia guainumbi</i> (Pallas, 1764) | beija-flor-de-bico-curvo | White-tailed Goldenthroat | R | | | | x | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Ginegética ou Xerimbabo |
|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Amazilia leucogaster</i> (Gmelin, 1788) <i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818) <i>Amazilia brevirostris</i> (Lesson, 1829) <i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788) <i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832) <i>Clytolaema rubricauda</i> (Boddaert, 1783) <i>Heliothryx auritus</i> (Gmelin, 1788) <i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823) <i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783) | beija-flor-de-barriga-branca beija-flor-de-banda-branca beija-flor-de-hico-preto beija-flor-de-garganta-verde beija-flor-de-péito-azul beija-flor-rubi beija-flor-de-bochecha-azul bico-retro-de-banda-branca estrelinha-ametista | Plain-bellied Emerald Versicolored Emerald White-chested Emerald Glittering-throated Emerald Sapphire-spangled Emerald Brazilian Ruby Black-eared Fairy Stripe-breasted Starthroat Amethyst Woodstar | R R R R R R R R R | | | | x | |
| Ordem Trogoniformes | | | | | | | | |
| <i>Família Trogidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Trogon violaceus</i> Linnaeus, 1766 | surucuá-grande -de-barriga-amarela surucuá-variado surucuá-de-coleira surucuá-de-barriga-amarela | White-tailed Tropic Surucua Tropic Collared Tropic Black-throated Tropic | R | | | | x | |
| <i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817 <i>Trogon collaris</i> Vieillot, 1817 <i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788 | | | | | | | x EP x | x |
| Ordem Coraciiformes | | | | | | | | |
| <i>Família Alcedinidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766) <i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790) <i>Chloroceryle aenea</i> (Pallas, 1764) <i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788) <i>Chloroceryle inda</i> (Linnaeus, 1766) | martim-pescador-grande martim-pescador-verde martinho martim-pescador-pequeno martim-pescador-damata | Ringed Kingfisher Amazon Kingfisher American Pygmy Kingfisher Green Kingfisher Green-and-rufous Kingfisher | R R R R R | | | | | |
| <i>Família Momotidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818) | juruva-verde | Rufous-capped Motmot | R | | | | x | x |
| Ordem Galbuliformes | | | | | | | | |
| <i>Família Galbulidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Jacamaralcyon tridactyla</i> (Vieillot, 1817) <i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816 | cunelão airamba-de-cauda-ruiva | Three-toed Jacamar Rufous-tailed Jacamar | R, E R | | | | x x | x |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <i>Família Buccanidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Notharchus swainsoni</i> (Gray, 1846) <i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816) <i>Malacoptila striata</i> (Spix, 1824) <i>Monasa morphoeus</i> (Hahn & Küster, 1823) <i>Chelidoptera tenebrosa</i> (Pallas, 1782) | macuru-de-barriga-castanha joão-hobo barbudo-rajado chora-chuva-de-cará-branca urubuzinho | Buff-bellied Puffbird White-eared Puffbird Crescent-chested Puffbird White-fronted Nunbird Swallow-wing | R R E R R | CP CP VU VU VU | CP CP VU VU VU | x x x x x | x x x x x | x x x x x |
| <i>Ordem Piciformes</i> | | | | | | | | |
| <i>Família Ramphastidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> Lichtenstein, 1823 <i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766 <i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823) <i>Pteroglossus baillonii</i> (Vieillot, 1819) <i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758) | tucano-de-bico-preto tucano-de-bico-verde araçari-poca araçari-banana araçari-de-bico-branco | Channel-billed Toucan Red-breasted Toucan Spot-billed Toucanet Saffron Toucanet Black-necked Aracari | R R R R R | | | | x x x x x | x x x x x |
| <i>Família Picidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Picumnus cirratus</i> Temminck, 1825 <i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796) <i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818) <i>Veniliornis affinis</i> (Swainson, 1821) <i>Veniliornis maculifrons</i> (Spix, 1824) | pica-pau-anão-barrado birô, pica-pau-branco benedito-de-testa-anareia picapauzinho-avermelhado picapauzinho-de-testa-pintada | White-harred Piculet White Woodpecker Yellow-fronted Woodpecker Red-stained Woodpecker Yellow-eared Woodpecker | R R R R R | | | | VU VU VU VU VU | x x x x x |
| <i>Veniliornis passerinus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Piculus flavigula</i> (Bodddaert, 1783) <i>Piculus chrysochloros</i> (Vieillot, 1818) <i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821) <i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788) <i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) <i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788) <i>Celeus flavus</i> (Statius Muller, 1776) <i>Celeus torquatus</i> (Bodddaert, 1783) <i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818) | picapauzinho-anão pica-pau-bufador pica-pau-dourado-escuro pica-pau-dourado pica-pau-verde-barrado pica-pau-do-campo pica-pau-de-caheça-anareia pica-pau-amarelo pica-pau-de-coleira pica-pau-de-banda-branca pica-pau-rei | Little Woodpecker Yellow-throated Woodpecker Golden-green Woodpecker Yellow-browed Woodpecker Green-harred Woodpecker Campo Flicker Blond-crested Woodpecker Cream-colored Woodpecker Ringed Woodpecker Lineated Woodpecker Robust Woodpecker | R R R R R R R R R R | | | | x x x x x x x x x x | x x x x x x x x x x |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbabo |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Ordem Passeriformes | | | | | | | | |
| <i>Família Thamnophilidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816) | chocão-carijó matracão | Spot-backed Antshrike Giant Antshrike | R | | | x | x | |
| <i>Bataria cinerea</i> (Vieillot, 1819) | borralhara-assobiadora | Large-tailed Antshrike | R | | | x | x | |
| <i>Mackenziaena leachii</i> (Such, 1825) | borralhara | Tufted Antshrike | R | | | x | x | |
| <i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823) | choró-boi | Great Antshrike | R | | | | | |
| <i>Taraba major</i> (Vieillot, 1816) | choca-istrada | Chestnut-backed Antshrike | R | | | | | |
| <i>Thamnophilus palliatus</i> (Lichtenstein, 1823) | choca-de-sooretama | Sooretama Slaty-Antshrike | R, E | | | | | |
| <i>Thamnophilus ambiguus</i> Swainson, 1825 | choca-da-mata | Variable Antshrike | R | | | | | |
| <i>Thamnophilus caeruleiceps</i> Vieillot, 1816 | choca-de-chapéu-vermelho | Rufous-capped Antshrike | R | | | | | |
| <i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816 | choquinha-de-peito-pintado | Spot-breasted Antvireo | R, E | | | | | |
| <i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823) | choquinha-lisa | Plain Antvireo | R | | | | | |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823) | choquinha-chumbo | Plumbeous Antvireo | R, E | | | | | |
| <i>Dysithamnus plumbeus</i> (Wied, 1831) | ipecuá | Cinereous Antshrike | R | | | | | |
| <i>Thamnomanes caesius</i> (Temminck, 1820) | choquinha-de- | Star-throated Antvireo | R, E | | | | | |
| <i>Myrmotherula gularis</i> (Spix, 1825) | -garganta-pintada | | | | | | | |
| <i>Myrmotherula axillaris</i> (Vieillot, 1817) | choquinha-de-flanco-branco | White-flanked Antwren | R | | | | | |
| <i>Myrmotherula minor</i> Salvadori, 1864 | choquinha-pequena | Salvadori's Antwren | R, E | | | | | |
| <i>Myrmotherula urosticta</i> (Slater, 1857) | choquinha-de-rabo-cintado | Band-tailed Antwren | R, E | | | | | |
| <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822) | chorozinho-de-asa-vermelha | Rufous-winged Antwren | R | | | | | |
| <i>Formicivora grisea</i> (Boddaert, 1783) | papa-formiga-pardo | White-fringed Antwren | R | | | | | |
| <i>Formicivora serrana</i> Hellmayr, 1929 | formigueiro-da-serra | Serra Antwren | R, E | | | | | |
| <i>Formicivora rufa</i> (Wied, 1831) | papa-formiga-vermelho | Rusty-backed Antwren | R | | | | | |
| <i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822) | trovada | Ferruginous Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Drymophila genei</i> (Filippi, 1847) | choquinha-da-serra | Rufous-tailed Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Drymophila ochropyga</i> (Hellmayr, 1906) | choquinha -de-dorsos-vermelho | Ochre-rumped Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Drymophila squamata</i> (Lichtenstein, 1823) | pintadinho | Scaled Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Terenura maculata</i> (Wied, 1831) | zidéia | Streak-capped Antwren | R | | | | | |
| <i>Cercomacra brasiliiana</i> Hellmayr, 1905 | chororó-cinzento | Rio de Janeiro Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818) | papa-torca-do-sul | White-shouldered Fire-eye | R | | | | | |
| <i>Myrmeciza ruficauda</i> (Wied, 1831) | formigueiro-de-cauda-rúvia | Scalloped Antbird | R, E | | | | | |
| <i>Myrmeciza loricata</i> (Lichtenstein, 1823) | formigueiro-assobiador | White-bibbed Antbird | R, E | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica ou Xerimbabo |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <i>Família Conopophagidae</i> | | | | | | | |
| <i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831) | chupa-dente | Rufous Gnateater | R | | x | x | |
| <i>Conopophaga melanops</i> (Vieillot, 1818) | cuspidor-de-máscara-preta | Black-cheeked Gnateater | R, E | | x | x | |
| <i>Família Grallariidae</i> | | | | | | | |
| <i>Grallaria varia</i> (Boddart, 1783) | tovacuçu | Variegated Antpitta | R | VU | | x | |
| <i>Família Rhinocryptidae</i> | | | | | | | |
| <i>Ptilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835) | tapaculo-pintado | Spotted Bamboo-wren | R | | | x | x |
| <i>Merulaxis atter</i> Lesson, 1830 | entufado | Stalty Bristlefront | R, E | | | x | x |
| <i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriès, 1835) | tapaculo-do-espinhaço | Mouse-colored Tapaculo | R, E | | | x | x |
| <i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831) | macuquinho | White-breasted Tapaculo | R, E | | | x | x |
| <i>Família Formicariidae</i> | | | | | | | |
| <i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783 | galinha-do-mato | Rufous-capped Antthrush | R | | | x | |
| <i>Chamaezza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823) | tovaca-campainha | Short-tailed Antthrush | R | | | x | |
| <i>Chamaezza meruloides</i> Vigors, 1825 | tovaca-cantadora | Sooty Antthrush | R, E | | | x | |
| <i>Família Scleruridae</i> | | | | | | | |
| <i>Sclerurus mexicanus</i> Sclater, 1857 | vira-folha-de-peito-vermelho | Tawny-throated Leafnoser | R | | | x | |
| <i>Sclerurus caudacutus</i> (Vieillot, 1816) | vira-folha-pardo | Black-tailed Leafnoser | R | | | x | |
| <i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835) | vira-folha | Rufous-breasted Leafnoser | R | | | x | |
| <i>Família Dendrocolaptidae</i> | | | | | | | |
| <i>Dendrocincus turdinus</i> (Lichtenstein, 1820) | arapacu-liso | Plain-winged Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818) | arapacu-verde | Olivaceous Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Glyphorynchus spirurus</i> (Vieillot, 1819) | arapacu-de-bico-de-cunha | Wedge-billed Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818) | arapacu-de-garganta-branca | White-throated Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825 | arapacu-grande | Planalto Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Xiphorhynchus picus</i> (Gmelin, 1788) | arapacu-de-bico-branco | Straight-billed Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> (Vieillot, 1818) | arapacu-rajado | Lesser Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> (Lichtenstein, 1820) | arapacu-de-garganta-amarela | Buff-throated Woodcreeper | R | | | x | |
| <i>Lepidocolaptes squamatus</i> (Lichtenstein, 1822) | arapacu-escamado | Scaled Woodcreeper | R, E | | | x | |
| <i>Campylorhamphus falcularius</i> (Vieillot, 1822) | arapacu-de-bico-torto | Black-billed Scythebill | R | | | x | |
| <i>Família Furnariidae</i> | | | | | | | |
| <i>Furnarius figulus</i> (Lichtenstein, 1823) | casaca-de-couro-da-Jama | Wing-banded Hornero | R, E | | | x | |
| <i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788) | joão-de-barro | Rufous Hornero | R | | | x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbaço |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Oreophylax moreirae</i> (Miranda-Ribeiro, 1906) | garrincha-chorona | Itatiaia Thistletail | R, E | | | | x | x | |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819 | pichororé | Rufous-capped Spinetail | R | | | | | | |
| <i>Synallaxis frontalis</i> Pelezein, 1859 | petrim | Sooty-fronted Spinetail | R | | | | | | |
| <i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823 | uí-pi | Pale-breasted Spinetail | R | | | | | | |
| <i>Synallaxis spixii</i> Sclater, 1856 | jão-teneném | Spix's Spinetail | R | | | | x | x | |
| <i>Cranioleuca pallida</i> (Wied, 1831) | arreio-pálido | Pallid Spinetail | R, E | | | | x | x | |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788) | curuté | Yellow-chinned Spinetail | R | | | | x | x | |
| <i>Thripophaga macroura</i> (Wied, 1821) | rabo-amarelo | Striated Softtail | R, E | | | | x | x | |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i> (Wied, 1821) | joão-de-pau | Rufous-fronted Thornbird | R | | | | x | x | |
| <i>Phacellodomus ferrugineigula</i> (Pezeln, 1858) | joão-botina-do-brejo | Orange-eyed Thornbird | R | | | | x | x | |
| <i>Anumbius annumbi</i> (Vieillot, 1817) | cochicho | Firewood-Gatherer | R | | | | x | x | |
| <i>Anabacerthia amaraonis</i> (Temminck, 1823) | limpa-folha-miúdo | White-browed Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832) | trepador-quiete | Buff-browed Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Philydor lichtensteinii</i> Cabanis & Heine, 1859 | limpa-folha-ocraçeo | Ochre-breasted Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Philydor atricapillus</i> (Wied, 1821) | limpa-folha-coroado | Black-capped Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818) | limpa-folha-de-testa-baia | Buff-fronted Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Anabazenops fuscus</i> (Vieillot, 1816) | trepador-coleira | White-collared Foliage-gleaner | R, E | | | | x | x | |
| <i>Cichlocolaptes leucophaeus</i> (Jardine & Selby, 1830) | trepador-sobrancelha | Pale-browed Treehunter | R, E | | | | x | x | |
| <i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821) | barranqueiro-de-olho-branco | White-eyed Foliage-gleaner | R | | | | x | x | |
| <i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823) | joão-porca | Sharp-tailed Streamcreeper | R | | | | x | x | |
| <i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885 | trepadorzinho | Sharp-billed Treehunter | R | | | | x | x | |
| <i>Xenops minutus</i> (Sparmann, 1788) | bico-virado-miúdo | Plain Xenops | R | | | | x | x | |
| <i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821 | bico-virado-carijó | Streaked Xenops | R | | | | x | x | |
| <i>Família Tyrannidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Mionectes oleagineus</i> (Lichtenstein, 1823) | abre-asa | Ochre-bellied Flycatcher | R | | | | x | x | |
| <i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846 | abre-asa-de-cabeça-cinza | Gray-hooded Flycatcher | R | | | | x | x | |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846 | cabeçudo | Sepia-capped Flycatcher | R | | | | x | x | |
| <i>Corythopis delalandi</i> (Lesson, 1830) | estalador | Southern Antipit | R | | | | x | x | |
| <i>Hemirhacus diops</i> (Temminck, 1822) | olho-falso | Drab-breasted Bamboo-Tyrant | R | | | | x | x | |
| <i>Hemirhacus orbitatus</i> (Wied, 1831) | tirizinho-do-mato | Eye-ringed Tody-Tyrant | R, E | | | | x | x | |
| <i>Hemirhacusnidipendulus</i> (Wied, 1831) | tachuri-campainha | Hangnест Tody-Tyrant | R, E | | | | x | x | |
| <i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846) | tororó | Ochre-faced Tody-Flycatcher | R | | | | x | x | |
| <i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831) | teque-teque | Yellow-lored Tody-Flycatcher | R, E | | | | x | x | |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis & Heine, 1859 | ferreiraíno-relógio | Common Tody-Flycatcher | R | | | | x | x | |
| | piolhinho-chiador | Rough-legged Tyrannulet | R | | | | x | x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbabo |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Phyllomyias virescens</i> (Temminck, 1824) | piolhinho-verdoso | Greenish Tannulet | R | | | x | x | | |
| <i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822) | piolhinho | Planalto Tannulet | R | | | x | x | x | |
| <i>Phyllomyias griseocapilla</i> Schater, 1862 | piolhinho-serrano | Gray-capped Tannulet | R, E | | | x | x | x | |
| <i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835) | guaracava-cinzenta | Gray Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822) | guaracava-de-barriga-amarela | Yellow-bellied Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia albiceps</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | guaracava-de-crista-branca | White-crested Elenia | VS | | | | | | |
| <i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-de-bico-curto | Small-billed Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830) | tugue | Olivaceous Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia cristata</i> Pelzeln, 1868 | guaracava-de-topete-uniforme | Plain-crested Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia chiriquensis</i> Lawrence, 1865 | chibum | Lesser Elenia | R | | | | | | |
| <i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | tucão | Highland Elenia | R | | | | | | |
| <i>Ornithion inerme</i> Hartlaub, 1853 | poiaeiro-de-sobrancelha | White-lored Tannulet | R | | | | | | |
| <i>Campstostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824) | risadinha | Southern Beardless-Tyrannulet | R | | | | | | |
| <i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817) | joão-pobre | Sooty Tyrannulet | R | | | | | | |
| <i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) | alegrinho | White-crested Tannulet | R | | | | | | |
| <i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823) | mariinha-amarela | Yellow Tannulet | R | | | | | | |
| <i>Pseudocolopteryx sclateri</i> (Oustalet, 1892) | tricolino | Crested Doradito | R | | | | | | |
| <i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831 | baruhento | Tawny-crowned Pygmy-Tyrant | R | | | | | | |
| <i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822) | barbudimho | Southern Bristle-Tyrant | R | | | | | | |
| <i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824) | borboletinha-do-mato | Mottle-cheeked Tannulet | R | | | | | | |
| <i>Phylloscartes oustaleti</i> (Schater, 1887) | não-pode-parar | Sao Paulo Tyrannulet | R | | | | | | |
| <i>Phylloscartes difficilis</i> (Ihering & Ihering, 1907) | papa-moscas-de-olheiras | Oustalet's Tyrannulet | R, E | | | | | | |
| <i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis & Heine, 1859) | estalinho | Serra do Mar Tannulet | R, E | | | | | | |
| <i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818) | maria-pequena | Bay-ringed Tannulet | R | | | | | | |
| <i>Rhynchoscyrus olivaceus</i> (Temminck, 1820) | miudinho | Eared Pygmy-Tyrant | R | | | | | | |
| <i>Tolmomyias sulphureascens</i> (Spix, 1825) | bico-chato-grande | Olivaceous Flatbill | R | | | | | | |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i> (Taczanowski, 1884) | bico-chato-de-orelha-preta | Yellow-olive Flycatcher | R | | | | | | |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i> (Wied, 1831) | patinho | Gray-crowned Flycatcher | R | | | | | | |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818 | patinho-gigante | Yellow-breasted Flycatcher | R | | | | | | |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776) | filipe | White-throated Spadebill | R | | | | | | |
| <i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789) | assanhadinho | Russet-winged Flycatcher | VU | | | | | | |
| | | Bran-colored Flycatcher | R | | | | | | |
| | | Whiskered Flycatcher | R | | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbabo |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Myiobius atricaudus</i> Lawrence, 1863 | assanhadinho -de-cauda-preta gibão-de-couro enferjuado guaracavuçu piú-boreal papa-moscas-cinzento príncipe maria-preta-de-hico-azulado maria-preta-de-penacho maria-preta-de -garganta-vermelha suiriri-pequeno primavera noivinha-branca noivinha tesoura-do-brejo tesoura-cinzenta lavadeira-mascarada freirinha viuvinha suiriri-cavaleiro hem-te-vi-pirata benteviziño-de -asa-feruginea benteviziño-de -penacho-vermelho hem-te-vi benteviziño-do-brejo hem-te-vi-rajado neinei peitica suiriri tesouinha vissiá | Black-tailed Flycatcher Cliff Flycatcher Euler's Flycatcher Fuscous Flycatcher Olive-sided Flycatcher Tropical Pewee Vermilion Flycatcher Blue-billed Black-Tyrant Crested Black-Tyrant Velvety Black-Tyrant Yellow-browed Tyrant Gray Monjita White-rumped Monjita White Monjita Streamer-tailed Tyrant Shear-tailed Gray Tyrant Masked Water-Tyrant White-headed Marsh-Tyrant Long-tailed Tyrant Cattle Tyrant Piratic Flycatcher Rusty-margined Flycatcher Social Flycatcher | R | | | x | | | |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> (Gmelin, 1788) | | | | | | | | x | |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868) | | | | | | | | x | |
| <i>Chremisticus fuscatus</i> (Wied, 1831) | | | | | | | | x | |
| <i>Contopus cooperi</i> (Muttall, 1831) | | | | | | | | x | |
| <i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825) | | | | | | | | x | |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783) | | | | | | | | x | |
| <i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Knipolegus lophotes</i> Boie, 1828 | | | | | | | | x | |
| <i>Knipolegus nigerrimus</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Zolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816) | | | | | | | | x | |
| <i>Zolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823) | | | | | | | | x | |
| <i>Zolmis irupero</i> (Vieillot, 1823) | | | | | | | | x | |
| <i>Gubernettus yetapa</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823) | | | | | | | | x | |
| <i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766) | | | | | | | | x | |
| <i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764) | | | | | | | | x | |
| <i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819) | | | | | | | | x | |
| <i>Legatus leucophaius</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) | | | | | | | | x | |
| <i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825) | | | | | | | | x | |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) | | | | | | | | x | |
| <i>Philydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823) | | | | | | | | x | |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> (Stratius Müller, 1776) | | | | | | | | x | |
| <i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766) | | | | | | | | x | |
| <i>Empidonax varius</i> (Vieillot, 1818) | | | | | | | | x | |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819 | | | | | | | | x | |
| <i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808 | | | | | | | | x | |
| <i>Rhytipterna simplex</i> (Lichtenstein, 1823) | | | | | | | | x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbabo |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818) <i>Myiarchus tuberculifer</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | gritador maria-cavaleira-pequena | Sirystes Dusky-capped Flycatcher | R R | | | x x | | | |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis & Heine, 1859 <i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789) <i>Myiarchus tyrannulus</i> (Statius Muller, 1776) | irré maria-cavaleira maria-cavaleira-de -rabo-enferrujado | Swainson's Flycatcher Short-crested Flycatcher Brown-crested Flycatcher | R R R | | | x x | | | |
| <i>Ramphotrigon megacephalum</i> (Swainson, 1835) <i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819) <i>Attila spadiceus</i> (Gmelin, 1789) | capitão-de-saíra capitão-de-saíra-amarelo | Large-headed Flatbill Gray-hooded Attila Bright-rumped Attila | R R, E R | | | x x | | | |
| <i>Família Cotingidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Phytotoma rutila</i> Vieillot, 1818 <i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816 <i>Carpornis cucullata</i> (Swainson, 1821) | corta-ramos tesourinha-da-mata corocochó | White-tipped Plantcutter Swallow-tailed Cotinga Hooded Berryeater | VA (S) R R, E | | | WU WU WU | x x x | x | |
| <i>Carpornis melanopephala</i> (Wied, 1820) <i>Cotinga maculata</i> (Statius Muller, 1776) | sabiá-pimenta crejoá | Black-headed Berryeater Banded Cotinga | R, E R, E | | | CP EN | x x | x | x |
| <i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817) <i>Lipaugus vociferans</i> (Wied, 1820) <i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844) <i>Xiphocolaptes atropurpureus</i> (Wied, 1820) <i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792) | araponga crició tropeiro-da-serra anambé-de-asa-branca pavô | Bare-throated Bellbird Screaming Piha Cinnamon-vented Piha White-winged Cotinga Red-ruffed Fruitcrow | R R R, E R, E R | | | EP EN CP | x x x | x | |
| <i>Família Pipridae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Neopelma aurifrons</i> (Wied, 1831) <i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822) | fruxu-baiano papinho-amarelo | Wied's Tyrant-Manakin Wing-barred Piprites | R, E R | | | WU WU | x x | x | |
| <i>Ilicura militaris</i> (Shaw & Nodder, 1809) <i>Machaeropterus regulus</i> (Hahn, 1819) | tangarázinho tangará-rajado | Pin-tailed Manakin Striped Manakin | R, E R, E | | | | x | x | |
| <i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Chiroxiphia pareola</i> (Linnaeus, 1766) | rendeira tangará-falso | White-bearded Manakin Blue-backed Manakin | R R | | | EP EP | x x | x | |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793) <i>Dixiphia pipra</i> (Linnaeus, 1758) <i>Pipra rubrocincta</i> Temminck, 1821 | tangará cabeça-branca cabeça-encarnada | Blue Manakin White-crowned Manakin Red-headed Manakin | R R R | | | | x x x | x | |
| <i>Família Thrypidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821 <i>Schiffornis turdina</i> (Wied, 1831) | araponga-do-horto flautim-marron | Sharpbill Thrush-like Schiffornis | R R, E | | | WU WU | x x | x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinégetica ou Xerimbaço |
|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838) <i>Laniocera hypopyrra</i> (Vieillot, 1817) <i>Laniusoma elegans</i> (Thunberg, 1823) <i>Iodopleura pipra</i> (Lesson, 1831) <i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823) | flautim chorona-cinza chibante anambezinho anambé-branco-de-bochecha-parda anambé-branco -de-rabo-preto caneleiro-verde caneleiro caneleiro-preto caneleiro-bordado caneleiro-de-chapéu-preto | Greenish Schiffornis Cinereous Mourner Shrike-like Cotinga Buff-throated Purpleuft Black-crowned Tityra Black-tailed Tityra Green-backed Beccard Chestnut-crowned Beccard White-winged Beccard Black-capped Beccard Crested Beccard | R R, E R, E R R R R R R R R | CP VU | x | x | x | x |
| <i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766) | | | | | | | x | |
| <i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816) <i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine & Selby, 1827) <i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818) <i>Pachyramphus marginatus</i> (Lichtenstein, 1823) <i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823) | pitiguary juruviara verdinho-coroadão vite-vite-de-olho-cinza vite-vite | Rufous-browed Peppershrike Red-eyed Vireo Rufous-crowned Greenlet Gray-eyed Greenlet Lemon-chested Greenlet | R R R R R | x | x | x | x | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1739) <i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766) <i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822 <i>Hylophilus amaurocephalus</i> (Nordmann, 1835) <i>Hylophilus thoracicus</i> Temminck, 1822 | | Rufous-browed Peppershrike Red-eyed Vireo Rufous-crowned Greenlet Gray-eyed Greenlet Lemon-chested Greenlet | R R R R R | x | x | x | x | |
| <i>Família Vireonidae</i> | | | | | | | x | |
| <i>Cyanocorax cyanopogon</i> (Wied, 1821) | gralha-cancã | White-naped Jay | R, E | | | | | |
| <i>Família Hirundinidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Tachycineta albiventer</i> (Boddart, 1783) <i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817) <i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817) <i>Progne subis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789) <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) <i>Neochelidon tibialis</i> (Cassin, 1853) <i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822) <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-do-rio andorinha-de-sobre-branco andorinha-do-campo andorinha-azul andorinha-doméstica-grande andorinha-pequena-de-casa calcinha-branca andorinha-morena andorinha-serradora andorinha-do-barranco andorinha-de-bando | White-winged Swallow White-rumped Swallow Brown-chested Martin Purple Martin Grey-breasted Martin Blue-and-white Swallow White-thighed Swallow Tawny-headed Swallow Southern Rough-winged Swallow Bank Swallow Barn Swallow | R R R R R R R R R R R | | | | | |
| <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|--|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Família Troglodytidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823 <i>Campylorhynchus turdinus</i> (Wied, 1831) <i>Pheugopedius genibarbis</i> (Swainson, 1838) <i>Cantorchilus longirostris</i> (Vieillot, 1819) | coruá caratau garrinchão-pai-avô garrinchão-de-bico-grande | Southern House-Wren Thrush-like Wren Mustached Wren Long-billed Wren | R R R, E | | | | x x x | |
| <i>Família Donacobiidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Donacobius atricapillus</i> (Linnaeus, 1766) | japacanim | Black-capped Donacobius | R | | | | | |
| <i>Família Polioptilidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ramphocanurus melanurus</i> Vieillot, 1819 | bico-assovelado | Long-billed Gnatwren | R | | | | x | |
| <i>Família Turdidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Cichlopsis leucogenys</i> Cabanis, 1851 <i>Turdus flavipes</i> Vieillot, 1818 <i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818 <i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818 <i>Turdus fumigatus</i> Lichtenstein, 1823 <i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850 <i>Turdus subalaris</i> (Seebold, 1887) <i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818 | sabiá-castanhão sabidinha sabidinha-laranjeira sabidinha-barranco sabidinha-dá-mata sabidinha-poca sabidinha-ferreiro sabidinha-coleira | Rufous-brown Solitaire Yellow-legged Thrush Rufous-bellied Thrush Pale-breasted Thrush Cocoa Thrush Creamy-bellied Thrush Eastern Slaty-Thrush White-necked Thrush | R R R R R R R | EN EP | EN EP | x x x x x x x | x x x x x x x | |
| <i>Família Mimidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Mimus gilvus</i> (Vieillot, 1807) <i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823) | sabidinha-da-praia sabidinha-dá-campo | Tropical Mockingbird Chalk-browed Mockingbird | R R | | | | x | |
| <i>Família Motacillidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855 <i>Anthus hellmayri</i> Hartter, 1909 | caminheiro-zumbidor caminheiro-de-harriga-acanelada | Yellowish Pipit Hellmayr's Pipit | R R | | | | | |
| <i>Família Coerebidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758) | cambacica | Bananaquit | R | | | | | |
| <i>Família Thraupidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Ornithodoris abeillei</i> (Lesson, 1839) <i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790) <i>Schistochlamys ruficapillus</i> (Vieillot, 1817) <i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788) <i>Nemosia pileata</i> (Boddart, 1783) | sanhacu-pardo sanhacu-de-coleira bico-de-veludo tietinga saíra-de-chapéu-preto | Brown Tanager Black-faced Tanager Cinnamon Tanager Magpie Tanager Hooded Tanager | R, E R, E R R | | | | x x x | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbaço |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Nemosia rourei Cabanis, 1870</i> | sairá-apunhalada catirumbava saí-cândido | Cherry-throated Tanager Olive-green Tanager Orange-headed Tanager | R, E R, E R | CR | CP | x | x | x |
| <i>Orthogomys chloricterus (Vieillot, 1819)</i> | | | | | | | | |
| <i>Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)</i> | | | | | | | | |
| <i>Pyrhocoma ruficeps (Strickland, 1844)</i> | | | | | | | | |
| <i>Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818)</i> | tiê-de-topete sanhacu-de-fogo tiê-do-mato-grosso tiê-galo | Black-goggled Tanager Hepatic-Tanager Red-crowned Ant-Tanager Flame-crested Tanager | R R R R | x | x | x | x | x |
| <i>Piranga flava (Vieillot, 1822)</i> | tiê-preto | Ruby-crowned Tanager | R | x | x | x | | |
| <i>Habia rubica (Vieillot, 1817)</i> | pirira-vermelha tiê-sangue | Silver-beaked Tanager Brazilian Tanager | R R, E | x | x | x | x | x |
| <i>Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766)</i> | sanhacu-cinzento | Savaca Tanager | R | x | x | x | | |
| <i>Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822)</i> | sanhacu-de-encontro-azul | Azure-shouldered Tanager | R, E | x | x | x | | |
| <i>Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)</i> | sanhacu-de- | Golden-chevred Tanager | R, E | x | x | x | | |
| <i>Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766)</i> | -encontro-amarelo | | | | | | | |
| <i>Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)</i> | sanhacu-do-coqueiro | Palm Tanager | R | x | x | x | | |
| <i>Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817)</i> | sanhacu-frade | Diademed Tanager | R | x | x | x | | |
| <i>Thraupis ornata (Sparmann, 1789)</i> | saira-viúva cambada-de-chaves | Fawn-breasted Tanager White-bellied Tanager | R, E | x | x | x | | |
| | saira-sete-cores | Green-headed Tanager | R | x | x | x | | |
| | saira-militar | Red-necked Tanager | R | x | x | x | | |
| | saira-lagarta | Brassy-breasted Tanager | R, E | x | x | x | | |
| | saira-douradinha | Gilt-edged Tanager | R, E | x | x | x | | |
| | saira-amarela | Burnished-buff Tanager | R | x | x | x | | |
| | saira-sapucáia | Black-backed Tanager | R, E | x | x | x | | |
| | saira-diamante | Opal-rumped Tanager | R | x | x | x | | |
| | sair-andorinha | Swallow Tanager | R | x | x | x | | |
| | sair-de-máscara-preta | Black-faced Dacnis | R | x | x | x | | |
| | sair-de-pernas-pretas | Black-legged Dacnis | R, E | x | x | x | | |
| | sair-azul | Blue Dacnis | R | x | x | x | | |
| | saira-beija-flor | Red-legged Honeycreeper | R | x | x | x | | |
| | sair-verde | Green Honeycreeper | R | x | x | x | | |
| | saira-ferrugem | Rufous-headed Tanager | R, E | x | x | x | | |
| | saira-galega | Yellow-backed Tanager | R | x | x | x | | |
| | figuiinha-de-rabo-castanho | Chestnut-vented Conebill | R | x | x | x | | |
| | figuiinha-do-mangue | Bicolored Conebill | R | x | x | x | | |
| <i>Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823)</i> | | | | | | | | |
| <i>Pipreidea melanonota (Vieillot, 1819)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara brasiliensis (Linnaeus, 1766)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara seledon (Statius Muller, 1776)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara cyanocephala (Statius Muller, 1776)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara desmaresti (Vieillot, 1819)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara cyaniventris (Vieillot, 1819)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara cayana (Linnaeus, 1766)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara peruviana (Desmarest, 1806)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tangara velia (Linnaeus, 1758)</i> | | | | | | | | |
| <i>Tersina viridis (Illiger, 1811)</i> | | | | | | | | |
| <i>Dacnis lineata (Gmelin, 1789)</i> | | | | | | | | |
| <i>Dacnis nigripes Pelzeln, 1856</i> | | | | | | | | |
| <i>Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)</i> | | | | | | | | |
| <i>Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)</i> | | | | | | | | |
| <i>Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758)</i> | | | | | | | | |
| <i>Hemithrupis ruficapilla (Vieillot, 1818)</i> | | | | | | | | |
| <i>Hemithrupis flavicollis (Vieillot, 1818)</i> | | | | | | | | |
| <i>Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)</i> | | | | | | | | |
| <i>Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809)</i> | | | | | | | | |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Florestal | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Cinética ou Xerimbabo |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Família Emberizidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Müller, 1776) | tico-tico | Rufous-collared Sparrow | R | | | | | | x |
| <i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792) | tico-tico-do-campo | Grassland Sparrow | R | | | | | x | x |
| <i>Haplospiza unicolor</i> Cabanis, 1851 | cigarrinha-bambu | Uniform Finch | R | | | | | | |
| <i>Donacobius albifrons</i> (Vieillot, 1817) | tico-tico-do-banhado | Long-tailed Reed-Finch | R | | | | | | |
| <i>Poospiza thoracica</i> (Nordmann, 1835) | peito-pinhão | Bay-chested Warbling-finch | R, E | | | | | | |
| <i>Poospiza lateralis</i> (Nordmann, 1835) | quete | Red-rumped Warbling-Finch | R, E | | | | | | |
| <i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766) | canário-da-terra-verdeadeiro | Saffron Finch | R | | | | | | |
| <i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789) | tipio | Grassland Yellow-Finch | R | | | | | | |
| <i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817) | canário-do-campo | Wedge-tailed Grass-Finch | R | | | | | | |
| <i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789) | sabiá-dô-branhado | Great Pampa-Finch | R | | | | | | |
| <i>Embernagra longicauda</i> Strickland, 1844 | rabo-mole-dá-serra | Pale-throated Serra-Finch | R, E | | | | | | |
| <i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766) | tiziú | Blue-black Grosbeak | R | | | | | | |
| <i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869) | pixoxó | Buffy-fronted Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila falcirostris</i> (Temminck, 1820) | cigarra-verdeadeira | Temminck's Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila collaris</i> (Boddart, 1783) | coleirinho | Rusty-collared Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758) | bigo-dinho | Lined Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila nigriceps</i> (Vieillot, 1823) | baiano | Yellow-bellied Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila ardesiaca</i> (Dubois, 1894) | papa-capim-de-costas-cinzas | Dubois's Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823) | coleirinho | Double-collared Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila albogularis</i> (Spix, 1825) | golinho | White-throated Seedeater | R, E | | | | | x | x |
| <i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817) | chorão | White-bellied Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Müller, 1776) | caboclinho | Capped Seedeater | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila angolensis</i> (Linnaeus, 1766) | curiô | Chestnut-bellied Seed-Finch | R | | | | | x | x |
| <i>Sporophila maximiliani</i> (Cabanis, 1851) | bicudo | Great-tailed Seed-Finch | R | | | | | x | x |
| <i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830) | cigarra-do-coqueiro | Sooty Grosbeak | R | | | | | x | x |
| <i>Arremon taciturnus</i> (Hermann, 1783) | tico-tico-de-bico-preto | Pectoral Sparrow | R | | | | | x | x |
| <i>Arremon semitorquatus</i> Swainson, 1838 | tico-tico-do-mato | Half-collared Sparrow | R, E | | | | | x | x |
| <i>Coryphospingus pileatus</i> (Wied, 1821) | tico-tico-rei-cinza | Pileated-Finch | R | | | | | x | x |
| <i>Paroaria dominicana</i> (Linnaeus, 1758) | cardeal-do-nordeste | Red-cowled Cardinal | R, E | | | | | x | x |
| <i>Família Cardinalidae</i> | | | | | | | | | |
| <i>Caryothrautes canadensis</i> (Linnaeus, 1766) | furiel | Yellow-green Grosbeak | R | | | | | x | x |
| <i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800) | pimentâo | Black-throated Grosbeak | R | | | | | x | x |
| <i>Saltator maximus</i> (Statius Müller, 1776) | tempera-viola | Buff-throated Saltator | R | | | | | x | x |
| <i>Saltator similis</i> d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 | trinca-ferro-verdeadeiro | Green-winged Saltator | R | | | | | x | x |
| <i>Saltator maxillosus</i> Cabanis, 1851 | bico-grosso | Thick-billed Saltator | R | | | | | x | x |

| Nome Científico | Nome Popular | English Name | Status de Ocorrência no Brasil | Status de Conservação Lista Nacional | Status de Conservação Lista Estadual | Espécie Endêmica (Mata Atlântica) | Espécie Exótica | Espécie Ginegética ou Xerimbabo |
|---|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Cyanoloxia glaucopteraea</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) <i>Cyanocompsa brissonii</i> (Lichtenstein, 1823) | azulinho azulão | Glaucous-blue Grosbeak Ultramarine Grosbeak | R R | CP | | | x | x |
| <i>Parula</i> pitayumi (Vieillot, 1817) <i>Dendroica</i> striata (Forster, 1772) <i>Dendroica</i> fusca (Statius Muller, 1776) <i>Genthypis</i> aequinoctialis (Gmelin, 1789) <i>Basileuterus</i> culicivorus (Deppe, 1830) <i>Phaeothlypis</i> rivularis (Wied, 1821) | mariquita mariquita-de-perna-clara mariquita-papo-de-fogo piá-cobra pula-pula pula-pula-ribeirinho | Tropical Parula Blackpoll Warbler Blackburnian Warbler Masted Yellowthroat Golden-crowned Warbler Neotropical River Warbler | R VN# R R R | | | x | | |
| <i>Família Parulidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Psarocolius decumanus</i> (Pallas, 1769) <i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766) <i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766) <i>Icterus jamacaii</i> (Gmelin, 1788) <i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819) <i>Agelaius cyanopus</i> (Vieillot, 1819) <i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819) <i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788) <i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789) <i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850) | japu guaxe encontro corrupião graúna carreirão garibaldi irauna-grande vira-hosata polícia-inglesa-do-sul | Crested Oropendola Red-rumped Cacique Epaulet Oriole Campo Troupial Chopi Blackbird Unicolored Blackbird Chestnut-capped Blackbird Giant Cowbird Shiny Cowbird White-browed Blackbird | R R R R R R R R R | | | x | x | x |
| <i>Família Icteridae</i> | | | | | | | | |
| <i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805) <i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766) <i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758) <i>Euphonia chalybea</i> (Mikan, 1825) <i>Euphonia cyanoccephala</i> (Vieillot, 1818) <i>Euphonia xanthogaster Sundevall</i> , 1834 <i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801) <i>Chlorophonia cyanea</i> (Thunberg, 1822) | pintassilgo fim-fim gaturano-verdadeiro cais-cais gaturano-rei fim-fim-grande fero-velho bandeirinha | Hooded Siskin Purple-throated Euphonia Violaceous Euphonia Green-chinned Euphonia Golden-rumped Euphonia Orange-bellied Euphonia Chestnut-bellied Euphonia Blue-naped Chlorophonia | R R R R R R R | | | x | x | x |
| <i>Família Fringillidae</i> | | | | | | | | |
| <i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758) | bico-de-lacre | Common Waxbill | R | | | | x | |
| <i>Família Passeridae</i> | | | | | | | | |
| <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | pardal | House Sparrow | R | 39 | 85 (RE: 4) | 355 | 139 | 27 |
| Total de espécies: 654 | | | | | | | | 78 (c:25; x: 54) |

Legenda:

- A seqüência sistemática e a nomenclatura científica-popular seguem a lista primária das aves do Brasil (CBRO 2008), que serviu também de base para a citação do seu *status* de ocorrência em nosso país: R- residente; VS- visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN- visitante sazonal oriundo do hemisfério norte; VA- vagante; VA (S)- migrante regular oriundo do sul; E- espécie endêmica do Brasil; # - status presumido mas não confirmado.
- O estudo de Parker III *et al.* (1996), combinado com Sick (1997), serviu de base para a citação das espécies associadas ao ambiente florestal (mangue arbóreo, mata de restinga e outras formações florestais do ES).
- A menção ao *status* de conservação das espécies seguiu a lista nacional (MMA 2008) e a lista estadual (Simon *et al.* 2007b), de acordo com as seguintes categorias de ameaça: CP ou CR- criticamente em perigo; EP ou EN- em perigo; VU- vulnerável; RE- regionalmente extinta.
- As aves endêmicas do bioma Mata Atlântica foram citadas segundo PARKER III *et al.* (1996), considerando as atualizações taxonômicas dos últimos anos (CBRO 2008).
- A menção às espécies submetidas à pressão de caça (aves cinegéticas) e de captura para cativeiro (xerimbabos) apoiou-se na literatura especializada (e.g. Sick 1997) e em entrevistas com ex-caçadores e experientes passarinheiros de vários municípios do Espírito Santo.
- Consulte o texto para os critérios de inclusão na categoria de espécies exóticas à avifana regional.

Considerações Finais

Outros estudos já se preocuparam com a diversidade das aves do território capixaba, como Pacheco e Bauer (em Sick 1997, pag. 137), mencionando 602 espécies, Venturini e Paz (2003), estimando 620 a 700 espécies, e Simon *et al.* (2005), indicando cerca de 650 espécies, sem que, entretanto, tenham fornecido a lista sistemática da avifauna por eles contabilizada. Portanto, o presente estudo corresponde à primeira lista atualizada das aves do Estado do Espírito Santo, após 42 anos da última compilação apresentada por Augusto Ruschi (1967).

A elevada riqueza de aves identificada em seu território é fruto da gama de ecossistemas aquáticos e terrestres que se distribuem ao longo de um gradiente altitudinal de quase 2.900 m, sendo que suas 654 espécies representam 35,8 % da avifauna do nosso país (CBRO 2008). Boa parte de suas aves possuem estreita afinidade com determinados tipos de unidades vegetacionais (endemismos da paisagem), as quais acabam por assumir grande relevância para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Entre outras palavras, isso significa dizer que importantes componentes de sua avifauna dependem fortemente das áreas naturais remanescentes, sem as quais eles e outros organismos associados desapareceriam de seu espaço territorial. Nesse caso, enquadram-se, por exemplo, *Glaucis dohrnii* (balança-rabo-canela), *Crax blumenbachii* (mutum-do-sudeste) e *Neomorphus geoffroyi* (jacu-estalo), com registros recentes unicamente para as “relictuais” matas de Tabuleiro ao norte do estado.

A bioinvasão é um fenômeno exponencial no mundo globalizado (Frigotto e Serafim-Junior 2007) e muitos fatores contribuem para a falsificação de avifaunas regionais no Brasil (Sick 1997). A constatação da ocorrência de inúmeros elementos exóticos revela mudanças graduais na paisagem capixaba, cujos impactos sobre a fauna nativa ainda estão por ser devidamente avaliados. A ocorrência de espécies exóticas (= alóctones) no Espírito Santo é decorrente do processo de expansão geográfica espontânea, fixando as espécies invasoras; ou é resultado da implementação incidental (fuga de cativeiro) e/ou proposital (soltura de cativas) de espécimes oriundos de outras regiões, favorecendo o estabelecimento das chamadas espécies introduzidas. A bioinvasão tem ocasionado um aumento no tamanho das populações das aves exóticas, gerando acréscimo de espécies em determinadas regiões da Mata Atlântica. Porém, tal ganho nem sempre resulta em riqueza líquida para a biodiversidade, em função da perda das espécies florestais ou de outros ambientes nativos (Willis e Oniki 2002, Simon e Lima 2004).

Apesar de sua pequena extensão territorial, o Espírito Santo também se destaca pelo seu elevado número de aves endêmicas da Mata Atlântica (139 espécies) e reservas florestais com inúmeras espécies de aves globalmente ameaçadas de extinção (Scott e Brooke 1985, Parker III e Goerck 1997, Olmos 2005). Contudo, a perda da qualidade de seus ecossistemas naturais e a pressão de caça/captura de exemplares da fauna silvestre ainda são ameaças iminentes para várias de suas espécies, especialmente em regiões carentes de unidades de conservação, trabalhos de fiscalização e programas de conservação ambiental.

Portanto, a manutenção de sua diversificada, interessante e peculiar avifauna ainda exige uma ação de conservação efetiva e multidisciplinar, para que todas as espécies (autóctones) que persistem em seu território estejam presentes numa próxima atualização da lista das aves do Espírito Santo, independente da época que venha a ser confeccionada.

Apoio:

As pesquisas do autor no Estado do Espírito Santo foram desenvolvidas com apoio logístico e/ou financeiro das seguintes instituições: FAESA – Faculdades Integradas São Pedro, Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica-IPEMA, Museu de Biologia Mello Leitão, Cepemar - Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda, Rhea Estudos e Projetos Ltda, Makoto Consultoria Ambiental, IEMA/MMA/Conservação Internacional do Brasil (Projeto Corredores Ecológicos), Instituto BioAtlântica, Biodinâmica, IBAMA-Vitória, Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia do município de Vitória (Processo FACITEC Nº 532.7902/2002) e FAPES/FUNCITEC (processo Nº 38882558/2007).

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, R. & VALE, C. C., 2007. Formações pioneiras: manguezais. In: M. SIMONELLI & C. N. FRAGA. (Org.). *Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo*. Vitória: IPEMA, p. 21-26.
- ALMEIDA, R., 2007. *Conservação dos Manguezais Capixabas e sua Importância para a Diversidade Biológica*. In: L. F. T. MENEZES, F. R. PIRES & O. J. PEREIRA, (Org.). *Ecossistemas Costeiros do Espírito Santo*: Vitória: EDUFES, p. 61-70.
- ARGEL-DE-OLIVEIRA, M. M., 1993. Publicar ou não publicar? Listas de espécies são necessárias? *Boletim CEO*, 9: 36-41.
- ASSIS, A. M. *Diversidade e Conservação das Florestas de Encosta no Espírito Santo*. In: L. F. T. MENEZES, F. R. PIRES & O. J. PEREIRA (Org.). *Ecossistemas Costeiros do Espírito Santo*. Vitória: EDUFES, p. 45-58.
- ASSIS, A. M., BRITO, R. C. & LIMA, L. N., 2007. *Florística e manejo de áreas degradadas no entorno da REBIO Augusto Ruschi*. In: L. A. Vieira & A. M. ASSIS (Org.). *Planejamento Paisagens Sustentáveis no Corredor Central da Mata Atlântica: Uma experiência na região centro-serrana do Espírito Santo*. Santa Teresa: APROMAI, p. 57-85.
- BAUER, C., 1999. *Padrões atuais de distribuição de aves florestais na região sul do Estado do Espírito Santo, Brasil*. Dissertação de Mestrado (Ciências Biológicas/Zoologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 158 p.
- BENCK, G. A. 2001. Lista de Referência das Aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. *Publicações Avulsas FZB*, 104 p.
- Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 2008. *Listas das aves do Brasil*. Versão 5/10/2008. Disponível em <<http://www.cbro.org.br>>. Acesso em: 08 junho de 2009.
- FRIGOTTO, F. S. & SERAFIM-JUNIOR, M., 2007. Primeiro registro de *Charybdis helleri* (Milne Edwards, 1867) (Crustacea) no litoral do Estado do Paraná. *Estud. Biol.*, 29 (67): 227-230.
- GARAY, I., KINDEL, A., RIZZINI, C. M., AGAREZ, F. V., LOUZADA, M. A. P., SANTOS, R. D. & VÍCENS, R. S., 2004. *Diversidade Funcional da Cobertura Arbórea*. In: I. Garay & C. M. Rizzini (Org.). *A Floresta Atlântica de Tabuleiros: Diversidade Funcional da Cobertura Arbórea*. 2. Petrópolis: Vozes, p. 3-26.
- MAGNAGO, L. F., ASSIS, A. M. & FERNANDES, H. Q. B., 2007. *Floresta Ombrófila Densa Submontana, Montana e Alto-montana*. In: *Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo*. Vitória: IPEMA, p. 45-50.
- MARSDEN, S. J.; WHIFFIN, M.; GALETTI, M., 2001. Bird diversity and abundance in forest fragments and *Eucalyptus* plantations around an Atlantic forest reserve, Brazil. *Biodiversity and Conservation*, 10:737-751.
- MATTOS, G. T., ANDRADE, M. A. & FREITAS, M. V., 1993. *Nova lista de aves do Estado de Minas Gerais. Revisada, ampliada e ilustrada (check-list)*. Belo Horizonte: Fundação Acangaú, 20 p.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2008. *Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção*. A. B. M. MACHADO, DRUMMOND, G. M. & PAGLIA, A. P. (ed.). Brasília: MMA; Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2v., 1420 p.
- NOVAES, F. C., 1974. Ornithology of the Amapá Territory. I. *Publicações Avulsas do Museu Paranaense Emilio Goeldi*, 25: 1-121.
- NOVAES, F. C., 1978. Ornithology of the Amapá Territory. II. *Publicações Avulsas do Museu Paranaense Emilio Goeldi*, 29: 1-75.

-
- OREN, D. C., 1991. Aves do Estado do Maranhão, Brasil. *Goeldiana* (série. Zool.), 9: 1-55.
- PACHECO, J. F. & BAUER, C., 2001. *A lista de aves do Espírito Santo de Augusto Ruschi (1953): uma análise crítica*. In: J. L. B. ALBUQUERQUE; Jr, J. F.; CÂNDIDO, F. C. STRAUBE, A. L. ROOS (Org.). *Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias*. Tubarão: Unisul, p. 261-278.
- PARKER III, T. A., STOTZ, D. F. & FITZPATRICK, J. W. 1996. *Ecological and distributional databases*. In: D. F. STOTZ, J. W. FITZPATRICK, T. A. PARKER III, D. K. MOSKOVITS (Org.). *Neotropical birds: ecology and conservation*. Chicago: The University of Chicago Press, p. 113-436.
- PARKER III, T. A., GOERCK, J. M., 1997. *The importance of national parks and biological reserves to birds conservation in the Atlantic forest region of Brazil*. In: J. V. J. REMSEN (Org.). *Studies in neotropical ornithology honoring Ted Parker*. Washington: The American Ornithologists' Union, p. 527-541.
- PEREIRA, O. J., 2007. *A cobertura vegetal no Estado do Espírito Santo*. In: M. SIMONELLI & C. N. FRAGA (Org.). *Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo*. Vitória: IPEMA, p. 17-20.
- RUSCHI, A., 1950. Fitogeografia do estado do Espírito Santo. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* (série Botânica), 1:1-353.
- RUSCHI, A., 1953. Lista das aves do Estado do Espírito Santo. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* (série Zool.), 11: 1-21.
- RUSCHI, A., 1967. Lista atual das aves do estado do Espírito Santo. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* (série Zool.), 28: 1-45.
- RUSCHI, A., 1982. *Beija-flores do estado do Espírito Santo*. Rio de Janeiro: Editora Rios, 263 p.
- RUSCHI, P. A. & SIMON, J. E. 2007. Primeiro Registro de *Agyrtia leucogaster* Gmelin 1788 (Aves: Trochilidae) para o Estado do Espírito Santo, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 15 (3): 451-452.
- SCHERER-NETO, P. & STRAUBE, F. C., 1995. Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia. Campo Largo: Logos Press.
- SCOTT, D. A. & BROOKE, M. L., 1985. *The endangered avifauna of southeastern Brazil: a report on the BOU/WWF expeditions of 1980/81 and 1981/82*. In: Conservation of Tropical Forest Birds. A. W. DIAMOND and T. E. LOVEJOY (eds.), Cambridge, UK: International Council for Birds Preservation, p. 115-139.
- SICK, H., 1985. Ornitologia Brasileira: uma Introdução. Brasília: Universidade de Brasília, Vol. 1: 1-482 p.; Vol 2. 483-827 p.
- SICK, H. & PABST, L. F., 1968. As aves do Rio de Janeiro (Guanabara) (Lista sistemática anotada). *Arquivos do Museu Nacional*, 53: 99-160.
- SICK, H., 1997. *Ornitologia Brasileira*. Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 862 p.
- SIMON, J. E., 2000. Composição da avifauna da Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa - ES. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, v.11/12: 149-170.
- SIMON, J. E., 2006. *Efeitos da fragmentação da Mata Atlântica sobre comunidades de aves da região serrana de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, Brasil*. Tese de Doutorado em Ciências Biológica/Zoologia - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 142 p.
- SIMON, J. E., 2007. As aves como grupo bioindicador da qualidade de ambientes em restauração. In: L. P. Siqueira & C. A. B. Mesquita (Org.). *Meu pé de Mata Atlântica: Experiências de Recomposição Florestal em Propriedades Particulares no Corredor Central*. Rio de Janeiro: Instituto BioAtlântica, p. 92-123.
- SIMON, J. E. & LIMA, S. R., 2004. Primeiro registro documentado de *Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766) (Anseriformes: Anhimidae) para o Estado do Espírito Santo, Brasil. *Ararajuba* 12 (2): 151-152.
- SIMON, J. E., LIMA, S. R., NOVAES, T. D. & ALVES, A., 2005. Primeiro registro de *Podicephorus major* (Boddaert, 1783) (Aves: Podicipedidae) para o estado do Espírito Santo, Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* (nova série) 11/12: 171-188.
- SIMON, J. E., LIMA, S. R. & CARDINALI, T., 2007a. Comunidades de aves no Parque Estadual da Fonte Grande, Vitória, Espírito Santo, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 24 (1): 121-132.
- SIMON, J. E., ANTAS, P. T. Z., PACHECO, J. F., EFÉ, M., RIBON, R., RAPOSO, M. A., LAPS, R., MUSSO, C., PASSAMANI, J. & PACCAGNELA, S.G., 2007b. As Aves Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo.

-
- In: Livro Vermelho das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo: S. L. MENDES, & M. PASSAMANI (Org.). Vitória: IPEMA, p. 47-64.*
- SIMON, J. E., PERES, J. & RUSCHI, P. A., 2008. A importância da Serra das Torres para a conservação de aves no Estado Espírito Santo, sudeste do Brasil. *Revista Científica FAESA*, 4 (1): 47-62.
- SIMONELLI, M., 2007. *Diversidade e Conservação das Florestas de Tabuleiro no Espírito Santo*. In: L. F. T. MENEZES, F. R. PIRES, & O. J. PEREIRA, (Org.). Ecossistemas Costeiros do Espírito Santo. Vitória: Edufes, p. 21-32.
- SOUZA, D. G. S., 1995. Lista das aves do Estado da Bahia. Feira de Santana: DALL.
- STOTZ, D. F., 1993. Geographic variation in species composition of mixed species flocks in lowland humid forests in Brazil. *Pap. Av. Zool.*, São Paulo, 38: 61-75.
- VENTURINI, A. C., OFRANTI, A. M. S., VAREJÃO, J. B. M. & PAZ, P. R., 1996. *Aves e mamíferos da restinga: Parque Estadual Paulo César Vinha – Setiba -Guarapari - ES*. Vitória: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável – SEDESU.
- VENTURINI, A. C., REHEN, M. P., PAZ, P. R. & CARMO, L. P., 2000. Contribuição ao conhecimento das aves da região centro-serrana do Espírito Santo: Municípios de Santa Maria de Jetibá e Itarana. *Atualidades Ornitológicas*, 98: 11-12; 99:12.
- VENTURINI, A. G. & PAZ, P. R., 2003. Registros documentados de aves inéditas ou de ocorrência rara no Espírito Santo. *Ararajuba*, 11(1): 95-99.
- VIELLARD, M. E. J. 1994. Catálogo dos Troquíideos do Museu de Biologia Mello Leitão. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*, 113 p.
- WILLIS, E. O. & ONIKI, Y., 2002. Birds of Santa Teresa, ES, Brazil: do humans add or subtract species? *Papéis Avulsos de Zoologia*, 42: 193-264.
- WILLIS, E.O. & ONIKI, Y., 2003. *Aves do Estado de São Paulo*. Rio Claro: Ed. Divisa, 398 p.