



[www.ceo.org.br](http://www.ceo.org.br)



Versão com lista  
adicional no final

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco



**BIÓLOGO FÁBIO FERRÃO VIDEIRA**

Presidente do CEO e Coordenador Téc. da CVMA / C Med

## PARCERIA:

Centro de Estudos Ornitológicos

Polícia Militar do Estado de São Paulo

Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico

BIÓLOGO FÁBIO FERRÃO VIDEIRA  
Presidente do CEO e Coordenador Téc. da CVMA / C Med

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco



Fontenele  
P·U·B·L·I·C·A·Ç·Õ·E·S

Copyright © 2020 por Fábio Ferrão Videira  
**Guia das Aves da Invernada do Barro Branco**

Fábio Ferrão Videira

**1ª Edição**  
Abril de 2020

*Edição*  
Fontenele Publicações

*Revisão:*  
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo.

*Diagramação:*  
Marcos Diques

**EBOOK ISBN – 978-65-86227-16-1**

CIP – (Cataloguing-in-Publication) – Brasil – Catalogação  
na Publicação  
Ficha Catalográfica feita na editora

---

VIDEIRA, Fábio Ferrão

Guia das Aves da Invernada do Barro Branco / Fábio Ferrão Videira . 1 ed.  
São Paulo, Fontenele Publicações, 2020.

144 p.; E-book;

EBOOK ISBN 978-65-86227-16-1

CDD 590

---

**Índice para catálogo sistemático**

1. Animais - Guia de Aves. 2. Pássaros.  
3. Animais - Aves da Invernada. I. Título

**Fontenele Publicações**

Rua Andaraí, 910 – Vila Maria – São Paulo-SP – CEP: 02.117-001

WhatsApp: 11 9-8635-8887

São Paulo: 11 4113-1346

contato@fontenelepublicacoes.com.br

## Introdução

A área verde da Invernada do Barro Branco da Polícia Militar do Estado de São Paulo, local onde se situa o Centro Médico e demais Unidades Militares, possui uma grande importância ambiental na Zona Norte da Cidade de São Paulo, sendo considerada Zona de Amortecimento do Parque Estadual Alberto Löfgren - Horto Florestal e do Núcleo Pedra Grande do Parque Estadual da Cantareira.

A Invernada encontra-se em área de transição entre a floresta e a antropização da metrópole de São Paulo, com extensão de mais de 121 hectares, possuindo uma rica e abundante fauna silvestre, contendo animais dos grupos herpetofauna, mastofauna, avifauna, entre outros.

Em destaque, podemos ressaltar a avifauna, com 120 espécies, entre endêmicas e migratórias, todas catalogadas na área da Invernada, mediante o “Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares”, iniciado em 2007, resultante da parceria entre o Centro de Estudos Ornitológicos (CEO) e a Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar (CVMA / C Med). O projeto em questão foi estendido a 15 complexos militares no Estado de São Paulo, pertencentes ao Exército Brasileiro, à Força Aérea Brasileira e à Polícia Militar, demonstrando seu sucesso.

A avifauna desperta nas pessoas grande interesse por sua beleza, comportamento, carisma, vocalização, o que pode aprimorar a atenção dos cidadãos por sua correlação com a flora e demais elementos da fauna, motivando-nos a promover ações para preservar e conservar o meio ambiente.

**Curiosidade:** A fim de potencializar a oferta alimentar à avifauna, a CVMA do C Med, com apoio da APMBB e ajuda da SVMA realizou-se, desde 2008, o plantio aproximado de 25.000 mudas arbóreas nativas na Invernada do Barro Branco.

*“Da natureza nada se tira, a não ser fotos; nada se mata, a não ser o tempo;  
nada se deixa, a não ser pegadas nos lugares certos”*

(Autor desconhecido)



## Dedicatória

À minha amada esposa Dinêila que me acompanha e colabora em todos os passos de minha vida.

Aos meus filhos queridos, Bruna e Arthur, razão de meu viver.

Aos meus queridos pais, Luzia Fátima e João Videira “*in memoriam*”.

Aos queridos sobrinhos.

Aos meus amigos fiéis que sempre me apoiam.

Ao amigo Dr Alcebíades Custódio Filho, renomado biólogo, o qual foi o pivô do início do presente estudo, aproximando-me do CEO.

Ao amigo Luiz Fernando pela ajuda na revisão técnica das espécies.

À amiga professora Irene Ramos pela atenção prestada no presente estudo.

À amiga Fabíola Campos, artista plástica, que gentilmente pintou o quadro da capa deste guia de aves.

A Sra. Chefe do Centro Médico, Ten Cel Med Maria Cecília e ao Sr. Subchefe, Ten Cel Med Aduino Carvalho.

Aos amigos e colegas de serviço, Maj Med Alexandre Rocha, Maj Med Maurício Domingues e Sd Mariotto Júnior.

Ao amigo Ten Cel André Luiz Magri, por ser a primeira pessoa no Centro Médico em apoiar o estudo do levantamento da Avifauna na Invernada.

Ao Dr Airton Grazioli, Consultor em Terceiro Setor, pelo apoio no estudo realizado.

Aos Comandantes e Chefes das Unidades Militares existentes no complexo da Invernada do Barro Branco.

Aos colegas do Centro de Estudos Ornitológicos, do Centro Médico, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Instituto Florestal e da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

E a todos e todas que colaboraram para a realização do presente trabalho.

## Reflexão - preservar e conservar, para quê?

A manutenção e conservação dos fragmentos florestais urbanos potencializam a qualidade de vida da sociedade que vive ou interage com as cidades. A região da Invernada, estudo do presente guia, possui uma rica e abundante fauna silvestre, onde podemos encontrar cento e quarenta e nove espécies distribuídas em cinquenta e nove famílias e vinte e seis ordens dos grupos: Herpetofauna (répteis e anfíbios); Avifauna (aves) e Mastofauna (mamíferos).

As florestas e as áreas verdes urbanas são demasiadamente importantes para a qualidade ambiental das cidades, já que assumem um papel de equilíbrio com o efeito regulador sobre o microclima, absorvendo grandes quantidades de radiação solar e dióxido de carbono, condicionando uma umidade no ar e uma eficiente barreira sonora.

O crescimento das áreas antropizadas e da urbanização nas cidades, fragmenta florestas e as áreas verdes urbanas de forma muito rápida e agressiva, impactando diretamente a fauna e a flora.


Almejo que o presente estudo estimule a preservação e conservação da floresta da Invernada do Barro Branco e dos demais fragmentos florestais de nossa e de outras cidades, promovendo a manutenção da saúde e conservação da fauna silvestre, além de estender os benefícios da flora à toda sociedade, aos seres vivos e aos recursos naturais do entorno.

Vale ressaltar que este estudo científico atende toda a nomenclatura e ordem sistemática padronizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o que possibilita aos servidores militares e civis e, ainda, aos funcionários terceirizados que trabalham nas doze Unidades da Polícia Militar e no Clube dos Oficiais existentes no complexo da Invernada do Barro Branco, a ampliação de seus conhecimentos sobre a avifauna local, de forma correta e didática. Para isso, este estudo apresenta fotos, informações detalhadas e direcionamento a *link* que possibilita escutar a vocalização da ave e acrescentar mais conteúdo sobre a mesma. Portando, trata-se de um excelente material educativo.

A importância deste estudo se pauta em seu papel educativo-ambiental inovador, pois é um excelente material didático e interativo, acessível a qualquer pessoa. O intuito é promover a reflexão sobre o que queremos, como agimos e como pretendemos deixar a natureza às futuras gerações.

Boa leitura.

## Mapa do Complexo da Invernada do Barro Branco



Dimensões da área da Invernada: 1.213.605,06 m²

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Equipe Coordenadora do Projeto

Fábio Ferrão Videira - Biólogo Especialista e Subten da Polícia Militar

Luiz Fernando de Andrade Figueiredo - Médico Sanitarista e Ornitólogo

Mário Sergio Olyntho - Cel Farm do Exército Brasileiro

Alvaro Antonio de Almeida Nascimento Silva - Cel Med da Força Aérea Brasileira

## Agradecimento

### Autoridades

João Doria - Governador do Estado de São Paulo

João Camilo Pires de Campos - Gen EB Secretário de Segurança Pública

Marcos Rodrigues Penido - Secretário da SIMA

Homero de Giorge Cerqueira - Cel PM Presidência do ICMBio - MMA

Álvaro Batista Camilo - Cel PM Secretário-executivo da SSP/SP

Fernando Alencar Medeiros - Cel PM Comandante Geral da PMESP

Luiz Alberto Bucci - Diretor Geral do Instituto Florestal

Airton Grazioli - Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo

José do Carmo Garcia - Cel PM Corregedor da PMESP

César Angelo Galletti Júnior - Cel Med PM Diretor de Saúde

Flávia de Paula Santos - Cel PM Comandante da Polícia Ambiental

Marcelo Miranda de Santana - Cel PM Administrador Geral da Invernada - Diretor da DEC

Alexandre Monclus Romanek - Cel PM Comandante da APMBB

Eduardo de Oliveira Fernandes - Cel PM Comandante do CAES

Antonio Chiari - Cel PM Presidente da AOPM - Clube dos Oficiais

Maria Cecília Araújo - Ten Cel Med PM Chefe do C Med

Ademir Euzébio Corrêa - Ten Cel Med PM Chefe do CRPM

Marcelo dos Santos Sancana - Ten Cel PM Comandante do PMRG

José Augusto Coutinho - Ten Cel PM Comandante do 4ºBPChoq

Mario Kitsuya - Maj PM Chefe Interino do CAPS

Douglas Shoichi Sano - Maj PM Chefe Interino do DCI

Gentil Epaminondas de Carvalho Júnior - Maj PM Comandante do COE

Alexandre Farrath Júnior - Maj PM Comandante do Canil

Aristides Maganin Júnior - Maj Vet PM Chefe do CPDRC

Marcus Helder Gobetti - Cap PM Chefe Setor de Intendência e Materiais pertencente a DL

### Autoridades do C Med que apoiaram e apoiam o Projeto

José Carlos Queiroz - Cel Med PM ex-chefe do C Med / DS

Antônio Yoshinori Hamada - Cel Med PM ex-chefe do C Med

Gilberto Jorge Curi - Cel Med PM ex-chefe do C Med

Luís Fernando de Carvalho Correa - Cel Med PM ex-chefe do C Med

Roberto Rodrigues Júnior - Cel Med PM ex-chefe do C Med / DS

Pedro Rebelo de Carvalho - Cel Med PM ex-chefe do C Med

Antônio Martins Tieppo - Cel Med PM ex-chefe do C Med



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

Sérgio Pereira Martins - Cel Med PM ex-chefe do C Med  
Renato Murilo Etchebehere - Cel Med PM ex-chefe do C Med  
Maria Cecília Araújo - Ten Cel Med PM Chefe do C Med  
Adauto Carvalho Silva - Ten Cel Med PM Chefe do Dept.º Téc./Clínico e Subchefe do C Med  
Luiz Fernando Adde - Ten Cel Med PM Chefe do Dept.º de Perícias Médicas  
Luís Antônio André Bolini - Maj Med PM Chefe do Dept.o de Perícias Médicas - Interino  
Maurício Domingues Ferreira - Maj Med PM Presidente da CVMA  
J. Alexandre Rocha Soares - Maj Med PM Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa - EPQCP  
Artur Abrão Luiz Scachetti - Maj PM Chefe da Divisão Administrativa  
Josiani Gonçalves da Silva Costa - Maj PM Chefe da Divisão Logística

## **Representantes governamentais e civis que apoiaram e apoiam o Projeto**

Alberto Amaro Canales dos Santos - Lenheira Pizzaria  
Alexsander Zamorano Antunes - Pesquisador Científico do IF  
Ana Maria Brischi - UMAPaz - SVMA  
André Luiz Magri - Ten Cel PM ex-chefe da Administração e Informática do C Med  
Anelisa Ferreira de Almeida Magalhães - Divisão da Fauna Silvestre - SVMA  
Anísio Araújo dos Santos - Ten Cel PM da APMBB  
Antonio Manoel Esteves - ex-subprefeito de Santana-Tucuruvi  
Celso Rubens de Palma - Empresário da Fabrinox  
Edson Luiz do Vale Hernandez - Greenlife Jardins e Áreas Verdes  
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho - ex-secretário da SVMA  
Elaine Santos - Gestora da OSCIP Ecolmeia  
Emerson Panis Kaseker - ex-presidente do CEO  
Fernanda Delborgo Abra - ViaFAUNA Estudos Ambientais  
Fernando Descio - Diretor Téc. da Div. De Reserva e Parq. Estaduais do Instituto Florestal  
Francisco Acácio de Freitas Oliveira Filho - Itacácio Mármore & Revestimentos  
Geraldo Antonio Daher Corrêa Franco - Pesquisador Científico do IF  
Gilberto Natalini - Vereador do Município de São Paulo  
Guilherme Brandão do Amaral - Viveiro Harry Blossfeld  
Jair do Nascimento - Técnico da CETESB - Agência Santana  
João Batista Baitello - Pesquisador Científico do IF  
José Maurício Weissaupt Perez - Cel PM ex-comandante da APMBB  
Juliana Laurito Summa - Diretora da Divisão da Fauna Silvestre - SVMA  
Jurandir Augusto Martim - Indígena da Aldeia Tekoa Yvy Porã  
Leni Meire Pereira Ribeiro Lima - Diretora Serv. Comunicações Téc.-Científicas do IF  
Letícia Bolian Zimback - Divisão da Fauna Silvestre - SVMA  
Linda Lacerda da Silva - UMAPaz - SVMA  
Luciano Vasconcelos Monferrari - ex-presidente do CEO  
Malcolm Forest - Fundador da AMAR - Representante da Sociedade local  
Márcio Port Carvalho - Pesquisador Científico do IF  
Maria Aparecida Visconti - ex-presidente do CEO  
Osny Tadeu de Aguiar - Pesquisador Científico do IF  
Paula Ribeiro Prist - ViaFAUNA Estudos Ambientais  
Priscila Comassetto Maciel - Meio Ambiente da Enel Distribuição SP

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

Reinaldo César Guedes - Analista de Sistemas WIKIAVES

Rejane Esteves - Pesquisadora Científica do IF

Renata Tavares de Menezes Caldas - IF

Ricardo Dino Tonelli - Técnico Ambiental da Subprefeitura Santana-Tucuruvi

Roberto Cimino - ex-subprefeito de Santana-Tucuruvi

Sérgio Massamitsu Arimori - Técnico Ambiental da SVMA

## **Diretoria do Centro de Estudos Ornitológicos**

PRESIDENTE: Fábio Ferrão Videira

PRIMEIRO SECRETÁRIO: Luiz Fernando de Andrade Figueiredo

SEGUNDO SECRETÁRIO: Ericson Cernawsky Igual

PRIMEIRO TESOUREIRO: Carin Cristina Orsi Duarte

SEGUNDO TESOUREIRO: André Ricardo de Souza

## **Conselho Fiscal do Centro de Estudos Ornitológicos**

Cláudia Oliveira

Ernesto Lipmann

June Lorraine Rodrigues Alves

Luciano Vasconcelos Monferrari

Maria Aparecida Visconti

## **Comissão do Verde e Meio Ambiente do C Med**

PRESIDENTE: Maurício Domingues Ferreira - Maj Med PM

COORDENADOR TÉCNICO: Fábio Ferrão Videira - Biólogo e Subten PM

MEMBRO TÉCNICO: N. Mariotto Júnior - Biólogo e Sd PM

EX-PRESIDENTE: Eduardo Joseph Sayegh - Ten Cel Farm PM

EX-MEMBRO: Rogério Pezato - Cap Med PM

## **Unidades Militares do complexo da Invernada do Barro Branco**

Diretoria de Ensino e Cultura (DEC)

Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB)

Centro de Altos Estudos de Segurança (CAES)

Centro Médico (C Med)

Centro de Reabilitação da Polícia Militar (CRPM)

Centro de Atenção Psicológica e Social (CAPS)

Presídio Militar Romão Gomes (PMRG)

Departamento de Comunicação e Infraestrutura (DCI)

Quarto Batalhão de Policiamento de Choque (4ºBPChq)

Comando de Operações Especiais (COE)

Canil da Polícia Militar

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Reprodução Canina (CPDRC)

Setor de Intendência de Materiais da Diretoria de Logística

Associação dos Oficiais da Polícia Militar (AOPM)

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Colaboradores associados ao CEO

Adilson Paulo Prudente do Amaral  
Alvaro Antonio de Almeida Nascimento Silva (Cel Med FAB)  
André Ricardo de Souza  
Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira  
Bruna Campos Ribeiro Ferrão Videira  
Caetano Beccari (1ºTen FAB)  
Celisa Tiemi Nakagawa Sera  
Cibele Aparecida Fabichak  
Dinêila Campos Ribeiro Videira  
Ernesto Lippmann  
Fábio Ferrão Videira (Subten PM)  
Gilberto Lima  
Julio Guedes Filho  
June Lorraine Rodrigues Alves  
Luciano Vasconcelos Monferrari  
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo  
Maria das Graças Albers  
Mário Sérgio Olyntho (Cel Farm EB)  
Massaaki Sera (Ten Cel Med PM)  
Mônica Guitian Ruiz  
Ricardo Pires de Campos

## Colaboradores

Airton Siqueira  
Alcebíades Custódio Filho - ex-associado do CEO  
Amarildo Emanuel Correia Jordão - ex-associado do CEO  
Aray José Guasques Sotto Maior (2ºTen PM) - ex-associado do CEO  
Ariovaldo Cristóvão Antônio Freitas (1º Sgt PM)  
Arthur Macarrão Montagnini - ex-associado do CEO  
Caio Hernandez Biangini Soares (Sd PM)  
Carlos Eduardo Araújo dos Santos - ex-associado do CEO  
Celso Pereira Bueno Filho (Maj PM)  
Daniel Ferreira da Silva (Sd PM)  
David Ricci Justino - Ambientalista  
Demis Bucci - ex-associado do CEO  
Eric Gallardo - ex-associado do CEO  
Fábio Calsa - ex-soldado Temporário  
Flavio Guglielmino - ex-associado do CEO  
Henrique Janoti (Sd FAB)  
Herculano Cardoso Ferrão  
Israel Esteves Rodrigues (Cb PM)  
Jefferson Rodrigues da Silva (1º Ten FAB)  
João Carnio Teles de Menezes - ex-associado do CEO  
Marcelo Augusto Filho (Sd PM)

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

Pedro Rogério de Souza Moreira (Sd PM)  
Rinaldo da Silva Zadi (2º Ten PM)  
Robert Vinícius Presença (Sd PM)  
Rodrigo Guiraldelo Gianezi (Sd PM)  
Sérgio Borges (2º Sgt FAB) - ex-associado do CEO "*in memoriam*"  
Sílvia Eliane Crema dos Santos (Cb PM)  
Wladimir Pereira Júnior - ex-associado do CEO

## **Artista plástica responsável pela obra de arte da capa**

Fabíola Campos

## **Desenho das orientações sobre a topografia das aves**

Arthur Campos Ribeiro Ferrão Videira

## **Fotógrafos(as) que autorizaram utilizar as fotos das aves**

André Ricardo de Souza  
Cárin Cristina Orsi Duarte  
Constantino Melo  
Demis Bucci  
Emerson Panis Kaseker  
Ericson Cernawsky Igual  
Fábio Ferrão Videira  
Flavio Guglielmino  
Gilberto Casarin Lima  
José Eduardo Rodrigues Martins  
Luciano Vasconcelos Monferrari  
Luiz Fernando Bravo  
Luiz Fernando de Andrade Figueiredo  
Maria das Graças Albers  
Peter Mix  
Sílvia Cristina Faustino Linhares de Albuquerque

## **Responsável pela colocação dos hiperlinks no índice**

Dinêila Campos Ribeiro Videira  
N. Mariotto Júnior

## **Revisão ortográfica**

Professora Irene de Lacerda Ramos  
Professora Katiane Costa Paiva Simone

## Índice

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Introdução .....                                    | 4  |
| Dedicatória .....                                   | 5  |
| Reflexão - preservar e conservar, para quê? .....   | 6  |
| Mapa do Complexo da Invernada do Barro Branco ..... | 7  |
| Orientações sobre a topografia das aves.....        | 20 |

### Nome popular

#### A

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Alma-de-gato .....              | 43  |
| Andorinhão-do-temporal .....    | 52  |
| Andorinha-pequena-de-casa ..... | 111 |
| Anu-branco .....                | 46  |
| Anu-preto .....                 | 45  |
| Arapaçu-grande .....            | 83  |
| Arapaçu-rajado .....            | 82  |
| Arapaçu-verde .....             | 81  |
| Araponga.....                   | 91  |
| Arredio-pálido .....            | 89  |
| Asa-branca .....                | 39  |
| Avoante .....                   | 40  |

#### B

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Bacurau .....                         | 50 |
| Bacurau-tesoura .....                 | 51 |
| Beija-flor-de-frente-violeta .....    | 55 |
| Beija-flor-de-peito-azul .....        | 56 |
| Beija-flor-tesoura .....              | 54 |
| Bem-te-vi.....                        | 96 |
| Bem-te-vi-rajado .....                | 97 |
| Bentevizinho-de-penacho-vermelho..... | 99 |
| Bico-chato-de-orelha-preta .....      | 92 |

#### C

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Cambacica.....                   | 134 |
| Canário-da-terra.....            | 130 |
| Carcará .....                    | 68  |
| Carrapateiro .....               | 69  |
| Choca-da-mata.....               | 79  |
| Chorozinho-de-asa-vermelha ..... | 78  |
| Chupa-dente .....                | 80  |



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Chupim .....            | 123 |
| Coleirinho .....        | 135 |
| Coró-coró.....          | 28  |
| Corruíra .....          | 112 |
| Coruja-orelhuda .....   | 48  |
| Corujinha-do-mato ..... | 47  |

## E

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Enferrujado ..... | 105 |
|-------------------|-----|

## F

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Falcão-de-coleira .....         | 70  |
| Ferreirinho-relógio.....        | 93  |
| Figuinha-de-rabo-castanho ..... | 129 |
| Filipe.....                     | 103 |

## G

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Garça-branca.....           | 25  |
| Garça-branca-pequena .....  | 27  |
| Gavião-carijó .....         | 31  |
| Gavião-de-cauda-curta ..... | 32  |
| Gavião-pega-macaco .....    | 33  |
| Gibão-de-couro .....        | 94  |
| Gralha-picaça .....         | 110 |

## I

|                      |    |
|----------------------|----|
| Inhambu-chintã ..... | 21 |
|----------------------|----|

## J

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jacuguaçu .....              | 22  |
| João-de-barro .....          | 84  |
| João-porca .....             | 85  |
| João-teneném .....           | 88  |
| Juriti-de-testa-branca ..... | 42  |
| Juriti-pupu .....            | 41  |
| Juruviara.....               | 109 |

## L

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Lavadeira-mascarada ..... | 104 |
|---------------------------|-----|

## M

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maitaca.....          | 76  |
| Maracanã-pequena..... | 71  |
| Maria-faceira.....    | 26  |
| Mariquita .....       | 119 |

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## N

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Neinei.....          | 98  |
| Noivinha-branca..... | 106 |

## P

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Papagaio .....                   | 77  |
| Papa-lagarta-de-euler.....       | 44  |
| Pardal.....                      | 140 |
| Pavó.....                        | 90  |
| Peitica .....                    | 102 |
| Periquitão .....                 | 72  |
| Periquito-verde .....            | 75  |
| Pia-cobra.....                   | 120 |
| Pica-pau-branco.....             | 62  |
| Pica-pau-de-banda-branca .....   | 67  |
| Pica-pau-de-cabeça-amarela ..... | 66  |
| Pica-pau-do-campo .....          | 65  |
| Pica-pau-verde-barrado .....     | 64  |
| Picapauzinho-de-coleira.....     | 61  |
| Picapauzinho-verde-carijó .....  | 63  |
| Pichororé.....                   | 87  |
| Pintassilgo.....                 | 139 |
| Pitiguari.....                   | 107 |
| Pombo-doméstico .....            | 38  |
| Pula-pula.....                   | 121 |
| Pula-pula-assobiador .....       | 122 |

## Q

|                  |    |
|------------------|----|
| Quero-quero..... | 36 |
|------------------|----|

## R

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Rabo-branco-acanelado..... | 53 |
| Risadinha.....             | 95 |
| Rolinha .....              | 37 |

## S

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sabiá-branco .....    | 114 |
| Sabiá-do-campo.....   | 117 |
| Sabiá-laranjeira..... | 115 |
| Sabiá-poca.....       | 116 |
| Sabiá-una .....       | 113 |
| Saí-azul .....        | 133 |
| Saí-canário .....     | 137 |

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Saíra-amarela .....       | 128 |
| Saíra-lagarta.....        | 125 |
| Saíra-viúva.....          | 124 |
| Sanhaço-cinzento.....     | 126 |
| Sanhaço-do-coqueiro ..... | 127 |
| Saracura-do-mato .....    | 34  |
| Saracura-sanã.....        | 35  |
| Socó-dorminhoco.....      | 23  |
| Socozinho.....            | 24  |
| Suiriri .....             | 100 |
| Surucuá-variado.....      | 57  |

## T

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Tauató-miúdo.....          | 30  |
| Tesourinha.....            | 101 |
| Tico-tico .....            | 118 |
| Tiê-de-bando .....         | 138 |
| Tiê-de-topete.....         | 131 |
| Tiê-preto .....            | 132 |
| Tiriba.....                | 73  |
| Trepador-quiete .....      | 86  |
| Trinca-ferro.....          | 136 |
| Tucano-de-bico-preto.....  | 59  |
| Tucano-de-bico-verde ..... | 60  |
| Tucanuçu .....             | 58  |
| Tuim .....                 | 74  |
| Tuju.....                  | 49  |

## U

|             |    |
|-------------|----|
| Urubu ..... | 29 |
|-------------|----|

## V

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Verdinho-coroado ..... | 108 |
|------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Autor e Elaborador do Guia ..... | 141 |
| Referências.....                 | 142 |
| Patrocinadores.....              | 144 |
| Apoio .....                      | 144 |

## Índice

### Nome científico

#### A

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <i>Accipiter striatus</i> ..... | 30 |
| <i>Amazilia lactea</i> .....    | 56 |
| <i>Amazona aestiva</i> .....    | 77 |
| <i>Aramides saracura</i> .....  | 34 |
| <i>Ardea alba</i> .....         | 25 |
| <i>Asio clamator</i> .....      | 48 |

#### B

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Basileuterus culicivorus</i> ..... | 121 |
| <i>Brotogeris tirica</i> .....        | 75  |
| <i>Buteo brachyurus</i> .....         | 32  |
| <i>Butorides striata</i> .....        | 24  |

#### C

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Camptostoma obsoletum</i> .....  | 95  |
| <i>Caracara plancus</i> .....       | 68  |
| <i>Celeus flavescens</i> .....      | 66  |
| <i>Chaetura meridionalis</i> .....  | 52  |
| <i>Coccyzus euleri</i> .....        | 44  |
| <i>Coereba flaveola</i> .....       | 134 |
| <i>Colaptes campestris</i> .....    | 65  |
| <i>Colaptes melanochloros</i> ..... | 64  |
| <i>Columba livia</i> .....          | 38  |
| <i>Columbina talpacoti</i> .....    | 37  |
| <i>Conirostrum speciosum</i> .....  | 129 |
| <i>Conopophaga lineata</i> .....    | 80  |
| <i>Coragyps atratus</i> .....       | 29  |
| <i>Cranioleuca pallida</i> .....    | 89  |
| <i>Crotophaga ani</i> .....         | 45  |
| <i>Crypturellus tataupa</i> .....   | 21  |
| <i>Cyanocorax chrysops</i> .....    | 110 |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> .....   | 107 |

#### D

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <i>Dacnis cayana</i> .....               | 133 |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> ..... | 83  |
| <i>Diopsittaca nobilis</i> .....         | 71  |
| <i>Dryocopus lineatus</i> .....          | 67  |

#### E

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <i>Egretta thula</i> .....       | 27  |
| <i>Empidonomus varius</i> .....  | 102 |
| <i>Eupetomena macroura</i> ..... | 54  |

#### F

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Falco femoralis</i> .....        | 70  |
| <i>Fluvicola nengeta</i> .....      | 104 |
| <i>Forpus xanthopterygius</i> ..... | 74  |

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <i>Furnarius rufus</i> ..... | 84 |
|------------------------------|----|

## G

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> ..... | 120 |
| <i>Guira guira</i> .....               | 46  |

## H

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <i>Habia rubica</i> .....                 | 138 |
| <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> ..... | 78  |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> .....        | 94  |
| <i>Hydropsalis torquata</i> .....         | 51  |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> .....        | 108 |

## L

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <i>Lathrotriccus euleri</i> .....    | 105 |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> .....     | 42  |
| <i>Leptotila verreauxi</i> .....     | 41  |
| <i>Lochmias nematura</i> .....       | 85  |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> ..... | 49  |

## M

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <i>Megarynchus pitangua</i> .....      | 98  |
| <i>Megascops choliba</i> .....         | 47  |
| <i>Melanerpes candidus</i> .....       | 62  |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> ..... | 28  |
| <i>Milvago chimachima</i> .....        | 69  |
| <i>Mimus saturninus</i> .....          | 117 |
| <i>Molothrus bonariensis</i> .....     | 123 |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> .....    | 97  |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> .....      | 103 |
| <i>Myiothlypis leucoblephara</i> ..... | 122 |
| <i>Myiozetetes similis</i> .....       | 99  |

## N

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <i>Nycticorax nycticorax</i> .....  | 23 |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> ..... | 50 |

## P

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <i>Pardirallus nigricans</i> .....     | 35  |
| <i>Passer domesticus</i> .....         | 140 |
| <i>Patagioenas picazuro</i> .....      | 39  |
| <i>Penelope obscura</i> .....          | 22  |
| <i>Phaethornis pretrei</i> .....       | 53  |
| <i>Piaya cayana</i> .....              | 43  |
| <i>Picumnus temminckii</i> .....       | 61  |
| <i>Pionus maximiliani</i> .....        | 76  |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> .....     | 124 |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> .....      | 96  |
| <i>Procnias nudicollis</i> .....       | 91  |
| <i>Psittacara leucophthalmus</i> ..... | 72  |
| <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> .....   | 111 |
| <i>Pyroderus scutatus</i> .....        | 90  |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> .....        | 73  |

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## R

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <i>Ramphastos dicolorus</i> .....  | 60 |
| <i>Ramphastos toco</i> .....       | 58 |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> ..... | 59 |
| <i>Rupornis magnirostris</i> ..... | 31 |

## S

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <i>Saltator similis</i> .....            | 136 |
| <i>Setophaga pitiayumi</i> .....         | 119 |
| <i>Sicalis flaveola</i> .....            | 130 |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> .....   | 81  |
| <i>Spinus magellanicus</i> .....         | 139 |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> .....          | 33  |
| <i>Sporophila caerulescens</i> .....     | 135 |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> .....      | 87  |
| <i>Synallaxis spixi</i> .....            | 88  |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> ..... | 86  |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> .....          | 26  |

## T

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <i>Tachyphonus coronatus</i> .....     | 132 |
| <i>Tangara cayana</i> .....            | 128 |
| <i>Tangara desmaresti</i> .....        | 125 |
| <i>Tangara palmarum</i> .....          | 127 |
| <i>Tangara sayaca</i> .....            | 126 |
| <i>Thalurania glaucopis</i> .....      | 55  |
| <i>Thamnophilus caerulescens</i> ..... | 79  |
| <i>Thlypopsis sordida</i> .....        | 137 |
| <i>Todirostrum cinereum</i> .....      | 93  |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> .....  | 92  |
| <i>Trichothraupis melanops</i> .....   | 131 |
| <i>Troglodytes musculus</i> .....      | 112 |
| <i>Trogon surrucura</i> .....          | 57  |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> .....     | 116 |
| <i>Turdus flavipes</i> .....           | 113 |
| <i>Turdus leucomelas</i> .....         | 114 |
| <i>Turdus rufiventris</i> .....        | 115 |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> .....    | 100 |
| <i>Tyrannus savana</i> .....           | 101 |

## V

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <i>Vanellus chilensis</i> .....      | 36  |
| <i>Veniliornis spilogaster</i> ..... | 63  |
| <i>Vireo chivi</i> .....             | 109 |

## X

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> ..... | 82  |
| <i>Xolmis velatus</i> .....       | 106 |

## Z

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Zenaida auriculata</i> .....   | 40  |
| <i>Zonotrichia capensis</i> ..... | 118 |




## Orientações sobre a topografia das aves

**Desenho: Arthur Ferrão**

Inspirado no Guia de Campo Aves da Grande São Paulo.

DEVELEY, P.F. e ENDRIGO, E.



1 testa  
2 loro  
3 maxila superior  
4 mandíbula  
5 mento  
6 garganta  
7 peito  
8 encontro

9 abdômen  
10 tarso  
11 dedo  
12 unha  
13 flanco  
14 rêmiges; asa  
15 crisso  
16 retrizes; cauda

17 uropígio  
18 dorso  
19 coberteiras da asa  
20 pescoço  
21 nuca  
22 píleo

## Inhambu-chintã

[Retorne ao Índice](#)

*Crypturellus tataupa*



Foto: Silvia Faustino Linhares

Sua vocalização é ouvida no interior da mata da Invernada do Barro Branco, mas é uma ave muito arisca, difícil de ser avistada.

É um tinamídeo relativamente comum em grande parte do Brasil e que apresenta boa resistência às alterações antrópicas.

Alimenta-se de diversas sementes, insetos, artrópodes e vermes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/inhambu-chinta>



## Jacuguaçu

*Penelope obscura*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O jacuguaçu, conhecido como jacuaçu, é uma ave de tamanho avantajado. No Centro Médico é muito presente, adentrando em alojamentos, ambulatório e até no Pronto Atendimento.

Seu habitat está vinculado a florestas. É um animal frugívoro, embora se alimente também de folhas, brotos, grãos e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/jacuacu>

## Socó-dorminhoco

[Retorne ao Índice](#)

*Nycticorax nycticorax*



Foto: Ferrão

O socó-dorminhoco é conhecido como savacu e pertence à família Ardeidae. Alimenta-se de peixes, anfíbios, crustáceos, insetos, pequenos répteis e filhotes de outras aves.

É comum encontrá-lo próximo aos lagos existentes na área do Presídio Militar Romão Gomes, incluindo o córrego do Mandaqui, que nasce neste local, no Interior da Invernada.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/savacu>



## Socozinho

[Retorne ao Índice](#)

*Butorides striata*



Foto: Ferrão

O socozinho é uma ave da família Ardeidae e podemos encontrá-la próximo aos lagos existentes na área do Presídio Militar Romão Gomes, mais especificamente no córrego Mandaqui, que nasce no Interior da Invernada.

Alimenta-se de peixes, insetos aquáticos, caranguejos, moluscos, anfíbios e répteis. Permanece imóvel por longos períodos, empoleirado sobre a água ou em suas proximidades, à espera de presas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/socozinho>

## Garça-branca

*Ardea alba*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A garça-branca, conhecida por garça-branca-grande, é uma ave da ordem Pelecaniformes e da família Ardeidae.

Podemos encontrá-la na área do Presídio Militar Romão Gomes, nos lagos do córrego do Mandaqui.

Alimenta-se principalmente de peixes e também de pequenos roedores, anfíbios, répteis, insetos, e além de pequenas aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-grande>



## Maria-faceira

*Syrigma sibilatrix*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

A maria-faceira é uma garça que geralmente vive solitária ou aos pares.

Podemos encontrá-la na área do Presídio Militar Romão Gomes, nos lagos e na Academia do Barro Branco, nas margens do córrego do Mandaqui.

Alimenta-se de insetos, anfíbios, pequenos roedores, peixes, minhocas e outros invertebrados.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maria-faceira>



## Garça-branca-pequena

[Retorne ao Índice](#)

*Egretta thula*



Foto: Ferrão

A garça-branca-pequena apresenta bico e tarsos pretos, e dedos dos pés amarelos.

Alimenta-se de peixes de forma bastante ativa. Aprecia também insetos, larvas, caranguejos, anfíbios e pequenos répteis.

É encontrada na Invernada, margeando os pequenos lagos existentes no Presídio Militar Romão Gomes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/garca-branca-pequena>

## Coró-coró

[Retorne ao Índice](#)

*Mesembrinibis cayennensis*



Foto: Ferrão

O coró-coró é uma ave frequentadora da Invernada, considerando a existência da floresta e áreas alagadas com cerca de 20 nascentes e pequenos regatos. Diariamente o coró-coró sobrevoa no final da tarde o Centro Médico, vocalizando.

Costuma ser flagrado pelas câmeras Trap existentes na mata da Invernada para monitoramento da fauna silvestre.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/coro-coro>



## Urubu

[Retorne ao Índice](#)

*Coragyps atratus*



Foto: Ferrão

Os urubus possuem significativa importância na natureza, mantêm o ambiente limpo, eliminando desde carcaças até ossos de animais mortos.

Ave do grupo dos abutres do Novo Mundo. Conhecido como urubu-de-cabeça-preta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-de-cabeça-preta>

## Tauató-miúdo

*Accipiter striatus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tauató-miúdo, conhecido como gavião-miúdo, é encontrado nas florestas da Invernada.

Ao alimentar-se, não hesita em atacar presas de tamanho maior. Sua dieta consiste principalmente em pequenas aves, incluindo pequenos roedores e pequenas rãs.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-miudo>



## Gavião-carijó

[Retorne ao Índice](#)

*Rupornis magnirostris*



Foto: Ferrão

O gavião-carijó é uma ave de rapina Accipitriforme da família Accipitridae. É comum ouvir sua vocalização na área verde do Centro Médico.

Alimenta-se de insetos, aves, lagartos e morcegos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-carijo>

## Gavião-de-cauda-curta

[Retorne ao Índice](#)

*Buteo brachyurus*



Foto: Flavio Guglielmino

É comum encontrar o gavião-de-cauda-curta sobrevoando o complexo da Invernada do Barro Branco.

Alimenta-se, principalmente de outras aves, além de répteis, invertebrados, anfíbios e roedores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-de-cauda-curta>

## Gavião-pega-macaco

[Retorne ao Índice](#)

*Spizaetus tyrannus*



Foto: Silvia Faustino Linhares

Gavião de tamanho avantajado com aproximadamente 70 cm.

Eventualmente o gavião-pega-macaco é observado sobrevoando o Centro Médico na companhia dos urubus (*Coragyps atratus*), com envergadura maior.

Alimenta-se de mamíferos, aves e répteis; tirados, em grande parte, das árvores da floresta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaviao-pega-macaco>



## Saracura-do-mato

[Retorne ao Índice](#)

*Aramides saracura*



Foto: Ferrão

A saracura-do-mato é uma ave gruiforme da família Rallidae. Bastante arisca.

É observada embrenhada na vegetação da mata ciliar do Córrego Ribeirão Tremembé, no Centro Médico.

Alimenta-se de ovos de pererecas, pequenos anfíbios e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-do-mato>



## Saracura-sanã

[Retorne ao Índice](#)

*Pardirallus nigricans*



Foto: Demis Bucci

A saracura-sanã pertence à família Rallidae.

É encontrada entre a vegetação fechada da floresta da Invernada, sendo muito arisca.

Alimenta-se de pequenos anfíbios, insetos, brotos, capins, larvas em brejos e beiras de lagos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saracura-sana>

## Quero-quero

*Vanellus chilensis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

Ave bastante comum, encontrada nos jardins e campos de futebol existentes na Invernada e no terraço do ambulatório do Centro Médico.

Sua vocalização deu origem a seu nome onomatopéico “quero-quero”.

Alimenta-se de invertebrados aquáticos, pequenos peixes e, ainda, de artrópodes e moluscos terrestres.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/quero-quero>



## Rolinha

*Columbina talpacoti*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

A rolinha, conhecida como rolinha-caldo-de-feijão, é uma das pombas mais comuns no Brasil, muito presente na Invernada e bem adaptada ao meio urbano. Alimenta-se de grãos encontrados no chão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/rolinha-roxa>

## Pombo-doméstico

[Retorne ao Índice](#)

*Columba livia*



Foto: Ferrão

O pombo-doméstico é uma espécie originária da Eurásia e África, introduzida no Brasil no início da colonização portuguesa. Adaptou-se perfeitamente à vida nas cidades em todos os continentes, com exceção da Antártica.

As fezes dessa ave podem transmitir muitas doenças ao homem, como histoplasmose, salmonelose, criptococose, toxoplasmose, entre muitas outras.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pombo-domestico>



## Asa-branca

[Retorne ao Índice](#)

*Patagioenas picazuro*



Foto: Ferrão

A asa-branca é uma ave columbiforme da família Columbidae. Vive nos campos com árvores, áreas urbanas, cerrados, caatingas e florestas de galeria. Frequentemente pode ser encontrada no Centro Médico. Foi referenciada na famosa música “Asa Branca” do Luiz Gonzaga.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pomba-asa-branca>

## Avoante

[Retorne ao Índice](#)

*Zenaida auriculata*



Foto: Luiz Fernando

A avoante, conhecida como pomba-de-bando, é uma ave da ordem dos Columbiformes, da família Columbidae.

Alimenta-se de grãos silvestres e de brotos de plantações.

Costuma ser vista, em grupos, nos jardins do Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/avoante>

## Juriti-pupu

*Leptotila verreauxi*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Peter Mix

A juriti-pupu ou juriti é uma ave da família Columbidae.

É granívora e frugívora. Alimenta-se de grãos, sementes, frutas e vegetais.

Vive nas matas e ambientes bem arborizados como o encontrado no Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-pupu>



## Juriti-de-testa-branca

[Retorne ao Índice](#)

*Leptotila rufaxilla*



Foto: Cárin Duarte

A juriti-de-testa-branca, também conhecida como juriti-gemeadeira, pertence à família Columbidae. Parecida com a juriti-pupu (*Leptotila verreauxi*). Ela é granívora e frugívora.

Os registros desta espécie foram obtidos por auxílio de armadilha fotográfica, mediante câmera Trap, instalada na mata do Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/juriti-gemeadeira>

## Alma-de-gato

*Piaya cayana*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

A alma-de-gato é possuidora de uma enorme cauda, que fica levemente caída durante o voo.

Sua alimentação é basicamente composta de insetos.

É encontrada nas matas da Invernada, mais frequentemente nas bordas da mata existente no Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/alma-de-gato>



## Papa-lagarta-de-euler

*Coccyzus euleri*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Maria Albers

O papa-lagarta-de-euler é uma ave cuculiforme da família Cuculidae. Encontramos essa ave nas bordas da floresta da Invernada. Alimenta-se de invertebrados pequenos e médios, principalmente lagartas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/papa-lagarta-de-euler>



## Anu-preto

*Crotophaga ani*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Peter Mix

O anu-preto pertence à família Cuculidae. É um animal carnívoro, alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, entre outros artrópodes. Encontrado, frequentemente, na Invernada do Barro Branco.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-preto>

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Anu-branco

*Guira guira*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O anu-branco é uma ave cuculiforme da família Cuculidae, possuidor de uma longa calda.

Alimenta-se de gafanhotos, percevejos, aranhas, miriápodes, peixes, lagartas, lagartixas, camundongos, rãs e filhotes de aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/anu-branco>



## Corujinha-do-mato

[Retorne ao Índice](#)

*Megascops choliba*



Foto: Ferrão

A corujinha-do-mato possui *habitat* noturno. É pertencente à família Strigidae.

Animal caçador. Alimenta-se de grandes artrópodes, minhocas, camundongos, morcegos, rãs, entre outros animais.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/corujinha-do-mato>



## Coruja-orelhuda

*Asio clamator*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

A coruja-orelhuda possui tamanho aproximado de 40 cm. É ouvida com frequência à noite, próximo ao Gabinete de Treinamento do Centro Médico.

Caça ratos, morcegos, anfíbios, répteis, insetos grandes e aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/coruja-orelhuda>

## Tuju

[Retorne ao Índice](#)

*Lurocalis semitorquatus*



Foto: Ericson Cernawsky Igual

O tuju é uma ave caprimulgiforme da família Caprimulgidae.

Não é fácil encontrá-la no período diurno, é mais comum avistá-la à noite, seguindo sua vocalização.

Alimenta-se de insetos capturados em voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tuju>



## Bacurau

[Retorne ao Índice](#)

*Nyctidromus albigollis*



Foto: Luiz Bravo

O bacurau é uma ave da família Caprimulgidae, conhecido por curiangó. Animal com hábito noturno.

Alimenta-se de vários tipos de insetos, como besouros, mariposas, borboletas, abelhas, vespas e formigas, os quais são capturados em voos curtos.

Essa espécie é encontrada caçando insetos, no campo de futebol da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no período noturno.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau>



## Bacurau-tesoura

[Retorne ao Índice](#)

*Hydropsalis torquata*



Foto: Ferrão

O bacurau-tesoura é um Caprimulgiforme da família Caprimulgidae, conhecido como curiango-tesoura.

Apenas os machos apresentam uma longa cauda em forma de tesoura.

Possui hábito noturno em campos, capoeiras, borda de matas e beiras de estradas.

A foto acima foi realizada no jardim interno da Divisão de Psiquiatria do Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/bacurau-tesoura>

## Andorinhão-do-temporal

[Retorne ao Índice](#)

*Chaetura meridionalis*



Foto: Constantino Melo

O andorinhão-do-temporal é uma ave apodiforme da família Apodidae.

É visto em bandos em determinada época do ano sobrevoando a Invernada, alimentando-se de pequenos insetos durante o voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinhao-do-temporal>

## Rabo-branco-acanelado

[Retorne ao Índice](#)

*Phaethornis pretrei*



Foto: Ferrão

O beija-flor rabo-branco-acanelado é uma ave muito rápida e pertence à família Trochilidae.

É visto polinizando as flores dos jardins do Centro Médico.

Alimenta-se principalmente de carboidratos, conseguido através do néctar das flores, mas come também pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/rabo-branco-acanelado>



## Beija-flor-tesoura

[Retorne ao Índice](#)

*Eupetomena macroura*



Foto: Peter Mix

O beija-flor-tesoura é abundante na região da Invernada, com um temperamento agressivo com relação às outras aves nectarívoras que adentram em seu território alimentar.

A beleza dessa ave com suas cores cintilantes, somada a capacidade de pairar no ar é incrível, pois desafia a gravidade.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-tesoura>

## Beija-flor-de-fronte-violeta

[Retorne ao Índice](#)

*Thalurania glaucopis*



Foto: Peter Mix

O beija-flor-de-fronte-violeta pertence à família Trochilidae.

É visto com sua beleza radiante polinizando as flores dos jardins do Centro Médico.

Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-fronte-violeta>

## Beija-flor-de-peito-azul

[Retorne ao Índice](#)

*Amazilia lactea*



Foto: Ferrão

O beija-flor-de-peito-azul é uma pequena ave com aproximadamente 9 cm, comum na região da Invernada. Podemos encontrá-la nos jardins do Centro Médico.

Alimenta-se de néctar e pequenos insetos.

Como as demais aves da família Trochilidae, possui uma beleza típica.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/beija-flor-de-peito-azul>



## Surucuá-variado

[Retorne ao Índice](#)

*Trogon surrucura*



Foto: Ferrão

O surucuá-variado é uma ave trogoniforme da família Trogonidae.

Habita as matas da Invernada, mas é difícil vê-la entre as folhagens.

Alimenta-se de insetos, vermes, moluscos e frutas, especialmente do palmito-juçara.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/surucua-variado>

## Tucanuçu

*Ramphastos toco*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

Espécie bastante marcante, com beleza singular e tamanho avantajado. Vive em casais ou em bandos.

Alimenta-se de frutas, insetos e artrópodes, mas costuma saquear ninhos de outras aves e devorar ovos e filhotes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tucanucu>

## Tucano-de-bico-preto

*Ramphastos vitellinus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

Ave linda, ameaçada de extinção, vista por duas vezes nas matas do Centro Médico.

Alimenta-se de frutos, artrópodes, ovos, filhotes de outras aves, anfíbios e morcegos. Costuma beber a água armazenada no interior de bromélias.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tucano-de-bico-preto>



## Tucano-de-bico-verde

[Retorne ao Índice](#)

*Ramphastos dicolorus*



Foto: Ferrão

Bastante comum no Centro Médico, habita as copas das árvores da mata da Invernada. Diariamente, sua vocalização típica é ouvida.

Alimenta-se de frutos de palmito-juçara, embaúba, pitanga, também de artrópodes e pequenos vertebrados. Come filhotes e ovos em ninhos de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tucano-de-bico-verde>

## Picapauzinho-de-coleira

[Retorne ao Índice](#)

*Picumnus temminckii*



Foto: Gilberto Casarin Lima

O picapauzinho-de-coleira, com apenas 10 cm, é visto entre os ramos da vegetação da mata ciliar no Córrego Ribeirão Tremembé, na área verde do Centro Médico.

Alimenta-se de insetos e larvas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-anao-de-coleira>

## Pica-pau-branco

*Melanerpes candidus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O pica-pau-branco, conhecido por birro, pertence à família Picidae.

Costuma ser visto entre os pinheiros (*Pinus elliottii*), localizado na margem da Praça do pintassilgo no interior do Centro Médico.

Alimenta-se de insetos, larvas, sementes, frutos e mel.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-branco>



## Picapauzinho-verde-carijó

[Retorne ao Índice](#)

*Veniliornis spilogaster*



Foto: Constantino Melo

O picapauzinho-verde-carijó é uma ave piciforme da família Picidae. Vive no estrato médio da floresta, em sua borda e outros jardins arborizados. Encontrado na mata ciliar do Córrego Ribeirão Tremembé, no interior do Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/picapauzinho-verde-carijo>

## Pica-pau-verde-barrado

[Retorne ao Índice](#)

*Colaptes melanochloros*



Foto: Ferrão

Pica-pau imponente, que possui *habitat* em paisagens abertas. Visto com frequência na Praça do pintassilgo, no interior do Centro Médico. Alimenta-se de formigas, cupins e outros artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:  
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-verde-barrado>



## Pica-pau-do-campo

[Retorne ao Índice](#)

*Colaptes campestris*



Foto: Ferrão

O pica-pau-do-campo é um grande pica-pau sul-americano, campestre e terrícola.

Vive em pequenos bandos, pousando com frequência no solo. É comum encontrá-lo nos jardins e praças internas, do Centro Médico.

Alimenta-se de insetos, principalmente formigas e cupins.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-do-campo>



## Pica-pau-de-cabeça-amarela

[Retorne ao Índice](#)

*Celeus flavescens*



Foto (fêmea): Ferrão

Pica-pau-de-cabeça-amarela, conhecido como João-velho. Ave muito bonita da família Picidae.

Costuma ser visto entre os pinheiros (*Pinus elliottii*), localizados na margem da Praça do Pintassilgo, no interior do Centro Médico.

Alimenta-se de insetos, suas larvas e ovos, formigas e cupins — nas árvores ou no solo — e de uma grande variedade de frutas e bagas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-cabeça-amarela>

## Pica-pau-de-banda-branca

*Dryocopus lineatus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

Ave piciforme da família Picidae. Sua vocalização é ouvida nas matas da Invernada.

Alimenta-se de insetos, larvas, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pica-pau-de-banda-branca>



## Carcará

[Retorne ao Índice](#)

*Caracara plancus*



Foto: Ferrão

O carcará é visto tanto sozinho como em bandos numerosos, em redor de mamíferos e carcaças. Corre o comensalismo entre carcarás e urubus.

Ave bastante comum em toda a Invernada.

Não é um predador especializado, mas generalista e oportunista.

Essa ave foi referenciada na famosa canção “Carcará”, composta por João do Valle e José Cândido, interpretada pela Maria Bethânia.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/cacara>



## Carrapateiro

[Retorne ao Índice](#)

*Milvago chimachima*



Foto: Ferrão

O carrapateiro é um dos gaviões mais conhecidos no Brasil. No Centro Médico, costuma ser encontrado na mata ciliar do Córrego Ribeirão Tremembé e na Praça do pintassilgo.

Alimenta-se de carrapatos, lagartas, cupins, frutas, entre outras opções. Além disso, saqueia ninhos de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/carrapateiro>

## Falcão-de-coleira

*Falco femoralis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O falcão-de-coleira, conhecido como cauré, gavião-de-coleira e gavião-pombo. É uma ave falconiforme da família Falconidae.

Caça rente ao solo, em campos e restingas. Às vezes, peneira. Alimenta-se de insetos, cupins, lagartixas, morcegos e, ocasionalmente, aves pequenas e serpentes peçonhentas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/falcao-de-coleira>

## Maracanã-pequena

*Diopsittaca nobilis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: André Ricardo de Souza

A maracanã-pequena é um psitacídeo. Vive em grupos.

Ave presente nas matas da Invernada.

Alimenta-se de coquinhos de palmeiras silvestres e outros frutos. É bastante barulhenta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maracana-pequena>



## Periquitão

[Retorne ao Índice](#)

*Psittacara leucophthalmus*



Foto (casal): Ferrão

O periquitão é conhecido por periquitão-maracanã. Vive em grupos barulhentos, que frequentam a área da Invernada do Barro Branco e sua alimentação consiste, principalmente, de frutos e sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:  
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquitao-maracana>

## Tiriba

*Pyrrhura frontalis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O tiriba pertencente à família Psittacidae, conhecido por tiriba-de-testa-vermelha. Encontra-se nas bordas das matas da Invernada.

Alimenta-se de frutas pequenas, frutos grandes, sementes e castanhas.

Essa ave costuma ficar de cabeça para baixo, enquanto come.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tiriba-de-testa-vermelha>

## Tuim

[Retorne ao Índice](#)

*Forpus xanthopterygius*



Foto: Silvia Faustino Linhares

O tuim é um dos menores representantes da família Psittacidae. Encontrado na Invernada em pequenos bandos.

Sua cor verde se confunde com as folhas das árvores, fazendo-o passar despercebido no ambiente. Somente o som de sua vocalização denuncia sua presença.

Alimenta-se de frutos, sementes e brotos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuim>



## Periquito-verde

*Brotopogeris tirica*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Maria Albers

O periquito-verde da família Psittacidae, conhecido por periquito-rico. Extremamente inteligente e popular na cidade de São Paulo e na Invernada; onde podemos ouvir sua vocalização típica e admirá-lo sobre as árvores. Costuma viver em grupos barulhentos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/periquito-rico>

## Maitaca

*Pionus maximiliani*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

A maitaca é um psitacídeo bastante comum na Invernada. Vive em casais ou em pequenos grupos.

É comum avistá-la em cima dos exemplares arbóreos, localizados no bolsão do estacionamento do Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/maitaca-verde>

## Papagaio

*Amazona aestiva*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Peter Mix

O papagaio ou papagaio-verdadeiro é comum na Invernada. Ave inteligente da família Psittacidae.

Geralmente, pelas manhãs, encontramos casais de papagaios sobrevoando o Centro Médico, vocalizando.

Alimenta-se de sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/papagaio-verdadeiro>



## Chorozinho-de-asa-vermelha

[Retorne ao Índice](#)

*Herpsilochmus rufimarginatus*



Foto: Flavio Guglielmino

O choro-zinho-de-asa-vermelha é um pássaro pequeno, medindo aproximadamente 11cm, da família Thamnophilidae.

Alimenta-se de insetos.

É encontrado na floresta da Invernada, principalmente nas matas ciliares, como a do Córrego Ribeirão Tremembé, no Centro Médico.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/chorozinho-de-asa-vermelha>

## Choca-da-mata

[Retorne ao Índice](#)

*Thamnophilus caerulescens*



Foto: Emerson Kaseker

O choca-da-mata é uma espécie frequente na floresta da Invernada, com hábito de mover lentamente a cauda para cima e para baixo enquanto vocaliza.

Alimenta-se de insetos, os quais captura ao inspecionar as folhas e os caules de trepadeiras, somando a pequenos frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/choca-da-mata>

## Chupa-dente

[Retorne ao Índice](#)

*Conopophaga lineata*



Foto: Silvia Faustino Linhares

O chupa-dente é encontrado no sub-bosque da mata da Invernada.

Vive solitário ou em casais. Forrageia próximo ao solo a procura de insetos, aracnídeos e outros artrópodes.

Alimenta-se de pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/chupa-dente>



## Arapaçu-verde

[Retorne ao Índice](#)

*Sittasomus griseicapillus*



Foto: Demis Bucci

O arapaçu-verde é um dos menores e mais comuns entre todos os arapaçus. Encontrado, frequentemente, escalando as árvores da mata da Invernada. Vive solitário ou em casais.

Alimenta-se de artrópodes, apanhando os insetos sobre a casca e em pequenos buracos no tronco das árvores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-verde>

## Arapaçu-rajado

*Xiphorhynchus fuscus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Gilberto Casarin Lima

O arapaçu-rajado é encontrado arrancando lascas de líquens e cascas das árvores próximas a Praça do pintassilgo, no interior do Centro Médico, buscando artrópodes escondidos. Essa técnica de alimentação é chamada “espaçar”.

Alimenta-se de lacraias, centopeias, moscas, aranhas e escorpiões.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-rajado>



## Arapaçu-grande

[Retorne ao Índice](#)

*Dendrocolaptes platyrostris*



Foto: Ferrão

O arapaçu-grande é uma ave passeriforme da família Dendrocolaptidae.

Costuma ser encontrada nas proximidades da Praça do pintassilgo, no Centro Médico.

É insetívoro. Explora fendas na madeira, cascas de árvores e bromélias, de onde tira aranhas, escorpiões, moscas, pererecas, girinos e lagartixas. Ocasionalmente, apanha abelhas e formigas-de-correição.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arapacu-grande>



## João-de-barro

*Furnarius rufus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O João-de-barro é famoso pelo seu ninho em formato de forno, muito bem estruturado.

É visto nas áreas verdes do Centro Médico, com seu andar elegante, revirando a gramínea a procura de alimento.

Alimenta-se de frutas, cupins, formigas, minhocas e restos alimentares humanos, como pedaços de pão.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-de-barro>

## João-porca

*Lochmias nematura*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Gilberto Casarin Lima

O João-porca é um passeriforme da família Furnariidae.

Não é visto com frequência. Os registros de observação dessa ave na Invernada foram realizados na parte baixa do Presídio Militar Romão Gomes.

Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-porca>



## Trepador-quiete

[Retorne ao Índice](#)

*Syndactyla rufosuperciliata*



Foto: Maria Albers

O trepador-quiete vive nos emaranhados de galhos e cipós, a pouca altura, no interior da mata da Invernada.

Possui o costume de forragear o estrato superior, acompanhando bandos mistos.

Alimenta-se de artrópodes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/trepador-quiete>



## Pichororé

[Retorne ao Índice](#)

*Synallaxis ruficapilla*



Foto: Luciano Monferrari

O pichororé é uma ave passeriforme da família Furnariidae.

Vive em casais no sub-bosque da mata da Invernada.

Alimenta-se de insetos e suas larvas, aranhas, outros artrópodes e moluscos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/pichorore>

## João-teneném

*Synallaxis spixi*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

O João-teneném, pertencente a família Furnariidae, é abundante no Centro Médico e em toda a Invernada, com sua vocalização típica.

Costuma pular ou esgueirar-se em meio à vegetação mais densa, empoleirando em locais abertos, apenas para cantar.

Alimenta-se de pequenos invertebrados, geralmente forrageando nos ramos baixos e, ocasionalmente, no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/joao-tenenem>

## Arredio-pálido

*Cranioleuca pallida*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

Podemos encontrar o arredio-pálido nas copas das árvores da borda da Invernada, em casais ou em bandos mistos.

Alimenta-se de insetos e suas larvas, aranhas e outros artrópodes. Costuma caçar em bandos mistos, procurando alimento entre as folhas e ramos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/arredio-palido>



## Pavó

[Retorne ao Índice](#)

*Pyroderus scutatus*



Foto: Silvia Faustino Linhares

O pavó é um dos maiores representantes da família Cotingidae. Conhecido como pavão-do-mato, pavaoa, jacu-touro e jacupiranga.

É visto próximo aos estandes de tiro da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na parte baixa da Invernada.

Alimenta-se de frutas e artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/pavo>

## Araponga

*Procnias nudicollis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

Essa ave possui uma vocalização singular e característica da espécie, extremamente forte e metálica, lembrado o som de um martelo batendo em uma bigorna.

Costuma ficar no alto das árvores da Invernada, nas épocas de frutificação das palmeiras.

Alimenta-se de frutas, bagas suculentas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/araponga>

## Bico-chato-de-orelha-preta

[Retorne ao Índice](#)

*Tolmomyias sulphurescens*



Foto: Luiz Bravo

O bico-chato-de-orelha-preta, ou simplesmente bico-chato, é uma ave da família Rhynchocyclidae.

Alimenta-se de insetos presentes entre as folhagens e ramos da vegetação da Invernada.

Sua vocalização lembra o som de um apito de juiz.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bico-chato-de-orelha-preta>



## Ferreirinho-relógio

*Todirostrum cinereum*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ericson Cernawsky Igual

O ferreirinho-relógio é encontrado com frequência entre a vegetação dos jardins do Centro Médico. Pertencente à família Rhynchocyclidae.

Ave pequena, com apenas 8 cm de tamanho.

Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/ferreirinho-relogio>

## Gibão-de-couro

*Hirundinea ferruginea*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

Podemos encontrar o gibão-de-couro na fachada do prédio do Hospital da Polícia Militar no Centro Médico.

Ele se alimenta caçando insetos, no ar, por meio de manobras rápidas e acrobáticas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gibao-de-couro>

## Risadinha

[Retorne ao Índice](#)

*Camptostoma obsoletum*



Foto: Sílvia Faustino Linhares

O risadinha é visto, em casais no alto das árvores existentes nos jardins e borda da mata no Centro Médico.

É uma pequena ave, com aproximadamente 10 cm de tamanho.

Alimenta-se de invertebrados e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/risadinha>



## Bem-te-vi

[Retorne ao Índice](#)

*Pitangus sulphuratus*



Foto: Ferrão

O bem-te-vi é uma ave bastante conhecida na Invernada.

Seu canto lembra as sílabas do seu nome onomatopeico “bem-te-vi”.

É uma ave agressiva, ameaça gaviões e urubus; quando esses se aproximam de seu território. Costuma pousar em lugares salientes como postes e topos de árvores.

Curiosidade: essa ave foi referenciada na canção “Bem-te-vi” de Renato Terra, no início da década de 80.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi>

## Bem-te-vi-rajado

[Retorne ao Índice](#)

*Myiodynastes maculatus*



Foto: Luiz Bravo

O bem-te-vi-rajado pertence à família Tyrannidae.

Alimenta-se de insetos, que apanha em voo, e de pequenos frutos, como o da canela-amarela, sendo um dispersor de sementes.

Vive em casais e habita as partes internas das matas ciliares encontradas na Invernada.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bem-te-vi-rajado>

## Neinei

[Retorne ao Índice](#)

*Megarynchus pitangua*



Foto: Ferrão

Ave bastante ouvida no Centro Médico, com vocalização onomatopeica, a qual deu origem ao seu nome “neinei”.

Alimenta-se de insetos, frutas, pequenos peixes, pequenos lagartos e filhotes de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/neinei>



## Bentevizinho-de-penacho-vermelho

[Retorne ao Índice](#)

*Myiozetetes similis*



Foto: Ferrão

O bentevizinho-de-penacho-vermelho, conhecido como bem-te-vizinho, pertence à família Tyrannidae.

A vocalização dessa ave é ouvida nas bordas da mata próxima ao Centro de Treinamento na Preservação da Vida do Centro Médico — estande de tiro da Unidade.

Alimenta-se de insetos, capturados durante pequenos voos, e de pequenas frutas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:  
<http://www.wikiaves.com.br/wiki/bentevizinho-de-penacho-vermelho>

## Suiriri

[Retorne ao Índice](#)

*Tyrannus melancholicus*



Foto: Ferrão

O suiriri é encontrado em todo o Brasil. Adapta-se até aos maiores conglomerados urbanos. Está presente na Invernada, principalmente no Centro Médico.

Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/suiriri>

## Tesourinha

*Tyrannus savana*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Edu Martins

Ave que possui uma longa cauda bifurcada. Durante o voo realiza manobras acrobáticas.

Ave migratória, formando grandes bandos durante os deslocamentos.

Alimenta-se de artrópodes e de pequenos frutos.

Encontrada na Invernada nos meses quentes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tesourinha>



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Peitica

[Retorne ao Índice](#)

*Empidonomus varius*



Foto: Silvia Faustino Linhares

A peitica é um animal migratório, que se faz presente na Invernada nos meses mais quentes.

Vive em bordas de matas, capoeiras e outras formações com árvores de tamanho médio.

Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos curtos a partir de um poleiro, e de pequenos frutos como os do tapiá.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/peitica>

## Filipe

[Retorne ao Índice](#)

*Myiophobus fasciatus*



Foto: Silvia Faustino Linhares

O filipe é uma ave passeriforme da família Tyrannidae.

É encontrado nas bordas das matas do Centro Médico e demais Unidades Militares da Invernada.

Alimenta-se de insetos alados, que apanha em voos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/filipe>

## Lavadeira-mascarada

[Retorne ao Índice](#)

*Fluvicola nengeta*



Foto: Ferrão

A lavadeira-mascarada costuma viver em casais, que caminham ativamente pelo solo.

É comum encontrá-la na parte baixa da Invernada.

Alimenta-se de pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/lavadeira-mascarada>



## Enferrujado

[Retorne ao Índice](#)

*Lathrotriccus euleri*



Foto: Luciano Monferrari

O enferrujado é uma ave passeriforme da família Tyrannidae e possui hábito solitário.

É vista, em determinada época do ano, no interior da mata da Invernada. Alimenta-se de artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/enferrujado>

## Noivinha-branca

*Xolmis velatus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Edu Martins

A noivinha-branca é uma ave graciosa.

Vive solitária ou em casais, sendo pouco notada por seu canto.

Alimenta-se principalmente de insetos capturados em voos curtos, retornando em seguida ao poleiro, mas também consome pequenos frutos.

Sua aparição na Invernada é modesta.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/noivinha-branca>

## Pitiguari

*Cyclarhis gujanensis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Silvia Faustino Linhares

O pitiguari vive no alto das árvores, cantando com frequência durante o período diurno.

Sua vocalização é ouvida próximo ao Centro de Atenção Psicológica e Social, na área do Centro Médico.

Alimenta-se de invertebrados, apanhados no meio da vegetação.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pitiguari>



## Verdinho-coroado

[Retorne ao Índice](#)

*Hylophilus poicilotis*



Foto: Demis Bucci

O verdinho-coroado pertence à família Vireonidae.

Convive em bandos mistos de aves.

Alimenta-se de insetos e suas larvas. Ainda come frutos que podem superar a quantidade de insetos ingeridos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/verdinho-coroado>

## Juruviara

*Vireo chivi*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Demis Bucci

O juruviara é uma ave migratória, que chega à Invernada nos meses mais quentes.

Vive no estrato médio das árvores.

Alimenta-se de insetos pequenos, como vespinhas, lagartas, formigas, besouros e cupins, aranhas e, às vezes, frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/juruviara>

## Gralha-picaça

*Cyanocorax chrysops*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

A gralha-picaça é uma ave passeriforme da família Corvidae.

Não é comum encontrá-la na Invernada, por ser muito arisca. Os espécimes vistos na Invernada estavam no Centro de Altos Estudos de Segurança, próximo aos alojamentos.

Alimenta-se de insetos, frutos e, às vezes, ovos de outras aves.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/gralha-picaca>



## Andorinha-pequena-de-casa

[Retorne ao Índice](#)

*Pygochelidon cyanoleuca*



Foto: Ferrão

A andorinha-pequena-de-casa está sempre presente em nosso dia-a-dia sobrevoando a Invernada, dando um verdadeiro show com suas acrobacias aéreas enquanto caçam insetos voadores.

Passam a maior parte do dia voando, pousando apenas para descansar ou quando o tempo está ruim.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/andorinha-pequena-de-casa>

## Corruíra

[Retorne ao Índice](#)

*Troglodytes musculus*



Foto: Constantino Melo

A corruíra é uma pequena ave com tamanho aproximado a 10 cm. É comum nos jardins do Centro Médico e demais Unidades da Invernada.

Vive sozinha e em casais.

Alimenta-se de pequenos insetos, aranhas e filhotes de lagartixa.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/corruira>

## Sabiá-una

*Turdus flavipes*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ericson Cernawsky Igual

Não é tão comum encontrar o sabiá-una na Invernada; porém, algumas vezes, foi visto e fotografado na borda da mata.

Alimenta-se de frutos de magnólia-amarela, palmitos, abacate e mamão, entre outros.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-una>



## Sabiá-branco

[Retorne ao Índice](#)

*Turdus leucomelas*



Foto: Constantino Melo

O sabiá-branco, conhecido como sabiá-barranco é comumente encontrado e/ou ouvido nos jardins do Centro Médico.

Alimenta-se, basicamente, de minhocas e artrópodes. Assim como outros sabiás, revira as folhas caídas em busca de pequenos invertebrados e se alimenta de pequenos frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-barranco>

## Sabiá-laranjeira

*Turdus rufiventris*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

Ave símbolo do Estado de São Paulo e do Dia Nacional das Aves. Bastante comum na Invernada, com sua vocalização típica.

No jardim principal do Centro Médico, essa linda ave é costumeiramente vista.

Alimenta-se de insetos, larvas, minhocas e frutas maduras, incluindo as cultivadas como: mamão, laranja e abacate. Come coquinhos de várias espécies de palmeiras.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-laranjeira>

## Sabiá-poca

[Retorne ao Índice](#)

*Turdus amaurochalinus*



Foto: Ferrão

O sabiá-poca pertencente à família Turdidae, é encontrado nas bordas da mata do Centro Médico e nos jardins da Unidade, como na Praça do pintassilgo. Onde é comum ouvi-lo vocalizando com seu agradável cantar.

Alimenta-se de invertebrados e pequenos frutos, principalmente no solo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-poca>



## Sabiá-do-campo

[Retorne ao Índice](#)

*Mimus saturninus*



Foto: Ferrão

É uma ave famosa por seu repertório de cantos, que imitam outras espécies de aves.

Ela é abundante na Invernada, principalmente no Centro Médico, vivendo em grupos familiares.

Alimenta-se principalmente de invertebrados e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sabia-do-campo>

## Tico-tico

*Zonotrichia capensis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

Encontramos o tico-tico em todas as áreas abertas na Invernada do Barro Branco, onde é comum.

Alimenta-se de sementes, brotos, frutas e insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico>

## Mariquita

*Setophaga pitaiyumi*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Gilberto Casarin Lima

A mariquita é uma ave passeriforme da família Parulidae. Vive no alto das árvores, podendo descer até pequenos arbustos.

Sua vocalização é ouvida na borda da mata na Invernada.

Alimenta-se de insetos, pequenas aranhas e lagartas, obtidas em flores e, às vezes, diretamente no voo.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/mariquita>



## Pia-cobra

[Retorne ao Índice](#)

*Geothlypis aequinoctialis*



Foto: Gilberto Casarin Lima

O pia-cobra é encontrado na mata ciliar de uma nascente, localizada morro abaixo do Heliponto no Centro Médico. Esconde-se em moitas de vegetação, sendo que sua observação se faz possível apenas quando voa.

Alimenta-se de insetos, principalmente, lagartas.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pia-cobra>

## Pula-pula

*Basileuterus culicivorus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

É encontrado nas florestas e sub-bosques da Invernada, constantemente pulando de galho em galho.

Muito difícil de fotografar, por não parar quieto.

Alimenta-se de pequenos artrópodes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pula-pula>

## Pula-pula-assobiador

*Myiothlypis leucoblephara*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luciano Monferrari

O pula-pula-assobiador é uma ave passeriforme da família Parulidae.

É encontrada no sub-bosque da floresta da Invernada.

Insetívora. Procura seu alimento, de preferência, no solo ou muito baixo na ramagem.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/pula-pula-assobiador>



## Chupim

[Retorne ao Índice](#)

*Molothrus bonariensis*



Foto: Ferrão

Essa ave vive em bandos, pousa no solo para alimentar-se.

Vocaliza em voo e é bastante conhecida por seu comportamento de parasitar ninhos de outras espécies de ave, como por exemplo o do tico-tico. Nesses momentos, ele bota seus ovos no ninho do tico-tico, enganando-o e estimulando-o a criar os tais filhotes como se fossem dele. Já foi vista, algumas vezes, essa prática no jardim interno do Centro Médico, onde os supostos pais (tico-tico) alimentavam o filhote muito maior que era do chupim.

Alimenta-se de insetos, sementes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/chupim>

## Saíra-viúva

[Retorne ao Índice](#)

*Pipraeidea melanonota*



Foto: Silvia Faustino Linhares

A saíra-viúva pertence à família Thraupidae.

Vive em casais no sub-bosque e estrato médio de mata, jardins e pomares.

Alimenta-se de frutos, insetos e sementes de alguns tipos de ervas daninhas que são colhidas no topo das árvores, no tronco e nos galhos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-viuva>

## Saíra-lagarta

*Tangara desmaresti*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Maria Albers

A saíra-lagarta é um passeriforme da família Thraupidae, de beleza inigualável, com suas cores vivas e chamativas, colorindo a Invernada.

Costumam viver em grupos de 5 a 7 indivíduos, no alto das árvores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-lagarta>



## Sanhaço-cinzento

[Retorne ao Índice](#)

*Tangara sayaca*



Foto: Constantino Melo

O sanhaço-cinzento é uma das aves mais comuns em nosso país e, também, na Invernada.

Alimenta-se de frutos, folhas, brotos, flores e insetos, como aleluias, entre outros.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-cinzento>

## Sanhaço-do-coqueiro

*Tangara palmarum*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Maria Albers

O sanhaço-do-coqueiro é uma ave passeriforme da família Thraupidae, encontrada com frequência nas palmeiras do Centro Médico.

Vive em casais e pequenos grupos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-do-coqueiro>

## Saíra-amarela

*Tangara cayana*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

A saíra-amarela é uma ave passeriforme da família Thraupidae.

Alimenta-se de frutos e insetos, como cupins e vespas.

Seu *habitat* é de matas abertas e ciliares, áreas cultivadas, parques e jardins; motivo pelo qual encontramos, com frequência, essa ave nos jardins do Centro Médico.

Vive em casais, nos diferentes estratos da vegetação.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/saira-amarela>



## Figuinha-de-rabo-castanho

[Retorne ao Índice](#)

*Conirostrum speciosum*



Foto (fêmea): Ferrão

A figuinha-de-rabo-castanho vive na copa das árvores, em pequenos grupos. É encontrada na floresta da Invernada.

Pertence à família Thraupidae.

Alimenta-se de insetos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/figuinha-de-rabo-castanho>

## Canário-da-terra

*Sicalis flaveola*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O canário-da-terra é um pássaro que chama muito a atenção, considerando seu amarelo intenso. Possui *habitat* em campos secos, de cultura e naturais; bordas de matas; entre outros locais.

Alimenta-se de sementes no chão.

É mais comum encontrá-lo no Presídio Militar Romão Gomes, no interior da Invernada.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/canario-da-terra>

## Tiê-de-topete

[Retorne ao Índice](#)

*Trichothraupis melanops*



Foto: Ferrão

O tiê-de-topete vive no sub-bosque da floresta, em casais e pequenos grupos.

É visto nas bordas da mata do Centro Médico e também na Praça do pintassilgo.

Alimenta-se de insetos, frutos como: banana e mamão, incluindo algumas sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-de-topete>



## Tiê-preto

*Tachyphonus coronatus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O macho possui um topete vermelho, nem sempre aparente.

É encontrado nos fragmentos de mata, no sub-bosque e jardins da Invernada; alimentando-se de pequenos artrópodes, frutos e flores.

Costuma viver em casais.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-preto>

## Saí-azul

*Dacnis cayana*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Ferrão

O saí-azul da ordem Passeriforme e família Thraupidae, possui *habitat* em florestas, bordas das matas e jardins. A cor azul dessa ave enfeita a Invernada. Vive em casal e/ou em pequenos grupos.

A fêmea é esverdeada.

Alimentam-se de artrópodes, frutos e néctar.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-azul>

## Cambacica

*Coereba flaveola*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Luiz Bravo

A cambacica é a única espécie da família Thraupidae no sistema classificativo tradicional.

Alimenta-se de néctar, frutas e artrópodes.

Acaba adentrando o Prédio do Hospital da Polícia Militar, Centro Médico, à procura de alimento.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/cambacica>



## Coleirinho

[Retorne ao Índice](#)

*Sporophila caerulescens*



Foto: Ferrão

O coleirinho é a espécie mais popular do grupo dos papa-capins, sendo também a mais abundante, na maioria dos locais onde está presente.

Essa espécie é vista em gramíneas na Invernada, alimentando-se de sementes.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/coleirinho>

## Trinca-ferro

*Saltator similis*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Constantino Melo

O trinca-ferro possui canto melodioso muito apreciado pelas pessoas. Vive em casais ou solitário. É encontrado no sub-bosque da Invernada. Animal onívoro, alimentando-se de frutos, insetos, sementes, folhas e flores.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/trinca-ferro>

## Saí-canário

[Retorne ao Índice](#)

*Thlypopsis sordida*



Foto: Luciano Monferrari

O saí-canário é pertencente à família Thraupidae, conhecido como canário-sapé.

Vive em casais, no alto das árvores e em arbustos próximo ao solo. É encontrado nas áreas verdes da Invernada, alimentando-se de frutos, sementes e insetos capturados na folhagem.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/sai-canario>



## Tiê-de-bando

[Retorne ao Índice](#)

*Habia rubica*



Foto: Demis Bucci

O tiê-de-bando pertence à família Cardinalidae, conhecido como tiê-da-mata. É encontrado nas matas ciliares existentes no complexo da Invernada. Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares.

Alimenta-se de artrópodes e frutos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<https://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-de-bando>

## Pintassilgo

*Spinus magellanicus*

[Retorne ao Índice](#)



Foto: Demis Bucci

O pintassilgo vive em bandos, pousando no alto das árvores ou em pequenos arbustos. É visto nas proximidades do Regimento de Cavalaria da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no interior da Invernada.

Alimenta-se de sementes e pequenos frutos secos.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pintassilgo>



## Pardal

[Retorne ao Índice](#)

*Passer domesticus*



Foto: Ferrão

O pardal trata-se de uma ave exótica, proveniente do Oriente Médio. Sua chegada ao Brasil foi através de soltura no Rio de Janeiro.

Alimenta-se de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de alimentos deixados pelos seres humanos.

Ultimamente, sua aparição está diminuindo na Invernada.

Para mais informações, fotos e áudio da vocalização da ave, acesse:

<http://www.wikiaves.com.br/wiki/pardal>



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Autor e Elaborador do Guia



**FÁBIO FERRÃO VIDEIRA**, biólogo, pesquisador, formado pela UNIESP, pós-graduado com especialização em MBA Gestão e Tecnologias Ambientais pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Policial Militar, presidente do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO, coordenador do Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares, coordenador técnico da Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar, responsável pelas passagens superiores de fauna arborícola instaladas na Zona Norte do município de São Paulo, administrador de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, ambientalista, auditor do Selo Verde Ecolmeia e consultor ambiental.

Contato: [ferrao.videira@hotmail.com](mailto:ferrao.videira@hotmail.com)

## Revisor do Guia



**LUIZ FERNANDO DE ANDRADE FIGUEIREDO**, médico, formado pela UFMG, pós-graduado com especialização em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Observador de aves e ornitólogo autodidata, membro honorário e fundador do Centro de Estudos Ornitológicos - CEO, primeiro secretário do CEO, membro do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO, editor do Boletim CEO e editor-técnico da Revista Atualidades Ornitológicas.

Contato: [luizfigueiredo@uol.com.br](mailto:luizfigueiredo@uol.com.br)

O **CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 57.063.992/0001-13, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com objetivos de congregar pessoas interessadas na observação de aves, ornitologia e temas correlatos, no desenvolvimento de estudos ornitológicos, na contribuição para a conservação da natureza em geral e das aves em particular e para a educação ambiental da população.

 [ceo@ceo.org.br](mailto:ceo@ceo.org.br)  [centro-de-estudos-ornitologicos.blogspot.com](http://centro-de-estudos-ornitologicos.blogspot.com)

 [www.instagram.com/ceoornitologia](https://www.instagram.com/ceoornitologia)  [www.facebook.com/ceoornitologia](https://www.facebook.com/ceoornitologia)

## Referências

CEO. **Centro de Estudos Ornitológicos**. Disponível em: <<http://www.ceo.org.br>>.

DEVELEY, P. F. e ENDRIGO, E. Guia de Campo - Aves da Grande São Paulo. **Aves & Fotos Editora**. 2ª ed. São Paulo/SP. 2011.

FERRÃO-VIDEIRA, F. Avifauna: instrumento educacional motivador para a preservação ambiental. 2010. 127p. TCC. **Faculdade Renascença - UNIESP**, São Paulo, 2010. Disponível em: <[https://drive.google.com/file/d/0B\\_9\\_cRZw\\_Ya4ZFg4RUJ3NnVuTGM/view](https://drive.google.com/file/d/0B_9_cRZw_Ya4ZFg4RUJ3NnVuTGM/view)>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. Classificação - Inventário da Fauna Silvestre do Complexo da Invernada do Barro Branco e Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2019. **Boletim Interno nº 005/2019 - Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo**. Disponível no link abaixo e no anexo do Boletim Interno nº C Med-005/2019 e suas atualizações posteriores.

<<https://drive.google.com/file/d/1wK2IGuQc1mSBezYPoCcyxatPHQkAyQ1-/view>>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. e FIGUEIREDO, L. F. A. Guia das Aves da Invernada do Barro Branco. **Centro de Estudos Ornitológicos - CEO / Comissão do Verde e Meio Ambiente do Centro Médico da Polícia Militar - CVMA / C Med**. São Paulo, 2019 / 2020 - ART nº 2019/07065. Disponível em: <<https://1drv.ms/b/s!AuRB2Hr8QtNXoV9WNZDhm6YD0tIh>>.

FERRÃO-VIDEIRA, F. e FIGUEIREDO, L. F. A. Levantamento da Avifauna na Invernada do Barro Branco. **Centro de Estudos Ornitológicos - CEO**. São Paulo, 2007/2019. Disponível em: <[http://www.ceo.org.br/relatorios/Invernada\\_da\\_PM.xls](http://www.ceo.org.br/relatorios/Invernada_da_PM.xls)>.

FERRÃO-VIDEIRA, F., FIGUEIREDO, L. F. A., OLYNTHO, M. S. e SILVA, A. A. A. N. Projeto de Levantamento de Aves em Áreas Militares. **Centro de Estudos Ornitológicos - CEO**. São Paulo, 2007/2019. Disponível no link abaixo:

<[http://www.ceo.org.br/relatorios/areas\\_militares.htm](http://www.ceo.org.br/relatorios/areas_militares.htm)>.

# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume III - Aves. In: **Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (Org.). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília: ICMBio. 709p. Disponível no link abaixo:

<[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro\\_vermelho\\_2018\\_vol3.pdf](http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/livro_vermelho_2018_vol3.pdf)>.

Nomenclatura e ordem sistemática. **Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO**, versão 2015. Disponível em: <<http://www.cbro.org.br/lista.htm>>.

Prefeitura Municipal de São Paulo, Inventário da Fauna Silvestre do Município de São Paulo. Secretaria do Verde e Meio Ambiente - Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre/DEPAVE-3. 2018. Disponível no link abaixo:

<[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/PUB\\_FAUNA\\_DIGITAL\\_2018%20download2.pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/PUB_FAUNA_DIGITAL_2018%20download2.pdf)>.

ROBERT, S. R. *et al.* Tradução ARGEL, M. *Wildlife Conservation Society* - Aves do Brasil - Mata Atlântica do Sudeste. **Editora Horizonte**. São Paulo/SP. 2015.

WIKIAVES. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível no link abaixo: <<https://www.wikiaves.com.br>>.

WIKIAVES. Invernada da PM. **A Enciclopédia das Aves do Brasil**. Disponível em: <<https://www.wikiaves.com.br/wiki/areas:invernada:inicio>>.



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## Patrocinadores



## Apoio



Secretaria da  
Segurança Pública | Secretaria de  
Infraestrutura e Meio Ambiente



# Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

## LISTA ADICIONAL DE ESPÉCIES ENCONTRADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO E-BOOK

“GUIA DAS AVES DA INVERNADA DO BARRO BRANCO” - 1ª Edição em Abril de 2020

EBOOK ISBN – 978-65-86227-16-1

| Taxon                           | Nome em Português               | English Name               |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Florisuga fusca</i>          | beija-flor-preto                | Black Jacobin              |
| <i>Heliomaster squamosus</i>    | bico-reto-de-banda-branca       | Stripe-breasted Starthroat |
| <i>Cathartes aura</i>           | urubu-de-cabeça-vermelha        | Turkey Vulture             |
| <i>Leptodon cayanensis</i>      | gavião-gato                     | Gray-headed Kite           |
| <i>Falco sparverius</i>         | quiriquiri                      | American Kestrel           |
| <i>Brotogeris chiriri</i>       | periquito-de-encontro-amarelo   | Yellow-chevroned Parakeet  |
| <i>Hypoedaleus guttatus</i>     | chocão-carijó                   | Spot-backed Antshrike      |
| <i>Xiphocolaptes albicollis</i> | arapaçu-de-garganta-branca      | White-throated Woodcreeper |
| <i>Tityra inquisitor</i>        | anambé-branco-de-bochecha-parda | Black-crowned Tityra       |
| <i>Pachyrhamphus validus</i>    | caneleiro-de-chapéu-preto       | Crested Becard             |
| <i>Cyanocorax cyanopogon</i>    | gralha-cancã                    | White-naped Jay            |
| <i>Gnorimopsar chopi</i>        | pássaro-preto                   | Chopi Blackbird            |

Totalizando no estudo **132 espécies** distribuídas em 17 Ordens e 39 Famílias, conforme o Relatório Oficial do CEO disponível no link abaixo:

[https://drive.google.com/file/d/1jOCXb0dGo2YcEONvZmEeLR08f8wLzNrc/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1jOCXb0dGo2YcEONvZmEeLR08f8wLzNrc/view?usp=share_link)

Aproveito para agradecer o apoio do Sr **Ten Cel Med PM CÉSAR AUGUSTO FERREIRA**, DD. Chefe do Centro Médico da Polícia Militar, bem como, do Sr **Maj Med PM JOSÉ AUGUSTO TAVARES MONTEIRO**, DD. Subchefe do Centro Médico da Polícia Militar - Interino e do Sr **Maj Med PM DANIEL DE GASPARI ANTONIO**, DD. Chefe da Divisão de Assessoria Médica.

FABIO FERRAO  
VIDEIRA:14390708813

Assinado de forma digital por FABIO  
FERRAO VIDEIRA:14390708813  
Dados: 2023.07.05 15:16:18 -03'00'

Biólogo pós-graduado - CRBio nº 079407/01-D  
**Presidente do Centro de Estudos Ornitológicos – CEO**  
Autor e Elaborador do Guia das Aves da Invernada do Barro Branco

**LISTA DA AVIFAUNA ENCONTRADA NA INVERNADA DO BARRO BRANCO DA POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO / SP - BRASIL**  
**CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS - CEO**

**“GUIA DAS AVES DA INVERNADA DO BARRO BRANCO”**

**EBOOK ISBN – 978-65-86227-16-1**

| O | F | E | Taxon                          | Nome em Português      | English Name            | Ordem sistemática |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 |   |   | <b>Tinamiformes</b>            |                        |                         | 1                 |
|   | 1 |   | <b>Tinamidae</b>               |                        |                         | 2                 |
|   |   | 1 | <i>Crypturellus tataupa</i>    | inhambu-chintã         | Tataupa Tinamou         | 3                 |
| 1 |   |   | <b>Galliformes</b>             |                        |                         | 4                 |
|   | 1 |   | <b>Cracidae</b>                |                        |                         | 5                 |
|   |   | 1 | <i>Penelope obscura</i>        | jacuguaçu              | Dusky-legged Guan       | 6                 |
| 1 |   |   | <b>Columbiformes</b>           |                        |                         | 7                 |
|   | 1 |   | <b>Columbidae</b>              |                        |                         | 8                 |
|   |   | 1 | <i>Columba livia</i>           | pombo-doméstico        | Rock Pigeon             | 9                 |
|   |   | 1 | <i>Patagioenas picazuro</i>    | pomba-asa-branca       | Picazuro Pigeon         | 10                |
|   |   | 1 | <i>Leptotila verreauxi</i>     | juriti-pupu            | White-tipped Dove       | 11                |
|   |   | 1 | <i>Leptotila rufaxilla</i>     | juriti-de-testa-branca | Gray-fronted Dove       | 12                |
|   |   | 1 | <i>Zenaida auriculata</i>      | avoante                | Eared Dove              | 13                |
|   |   | 1 | <i>Columbina talpacoti</i>     | rolinha-roxa           | Ruddy Ground-Dove       | 14                |
| 1 |   |   | <b>Cuculiformes</b>            |                        |                         | 15                |
|   | 1 |   | <b>Cuculidae</b>               |                        |                         | 16                |
|   |   | 1 | <i>Guira guira</i>             | anu-branco             | Guira Cuckoo            | 17                |
|   |   | 1 | <i>Crotophaga ani</i>          | anu-preto              | Smooth-billed Ani       | 18                |
|   |   | 1 | <i>Piaya cayana</i>            | alma-de-gato           | Squirrel Cuckoo         | 19                |
|   |   | 1 | <i>Coccyzus euleri</i>         | papa-lagarta-de-euler  | Pearly-breasted Cuckoo  | 20                |
| 1 |   |   | <b>Caprimulgiformes</b>        |                        |                         | 21                |
|   | 1 |   | <b>Caprimulgidae</b>           |                        |                         | 22                |
|   |   | 1 | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | tuju                   | Short-tailed Nighthawk  | 23                |
|   |   | 1 | <i>Nyctidromus albicollis</i>  | bacurau                | Common Pauraque         | 24                |
|   |   | 1 | <i>Hydropsalis torquata</i>    | bacurau-tesoura        | Scissor-tailed Nightjar | 25                |



|   |   |                                  |                              |                            |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 |   | <b>Apodiformes</b>               |                              | 26                         |
|   | 1 | <b>Apodidae</b>                  |                              | 27                         |
|   | 1 | <i>Chaetura meridionalis</i>     | andorinhão-do-temporal       | Sick's Swift               |
|   | 1 | <b>Trochilidae</b>               |                              | 29                         |
|   | 1 | <i>Florisuga fusca</i>           | beija-flor-preto             | Black Jacobin              |
|   | 1 | <i>Phaethornis pretrei</i>       | rabo-branco-acanelado        | Planalto Hermit            |
|   | 1 | <i>Heliomaster squamosus</i>     | bico-reto-de-banda-branca    | Stripe-breasted Starthroat |
|   | 1 | <i>Thalurania glaucopis</i>      | beija-flor-de-fronte-violeta | Violet-capped Woodnymph    |
|   | 1 | <i>Eupetomena macroura</i>       | beija-flor-tesoura           | Swallow-tailed Hummingbird |
|   | 1 | <i>Chionomesa lactea</i>         | beija-flor-de-peito-azul     | Sapphire-spangled Emerald  |
| 1 |   | <b>Gruiformes</b>                |                              | 36                         |
|   | 1 | <b>Rallidae</b>                  |                              | 37                         |
|   | 1 | <i>Pardirallus nigricans</i>     | saracura-sanã                | Blackish Rail              |
|   | 1 | <i>Aramides saracura</i>         | saracura-do-mato             | Slaty-breasted Wood-Rail   |
| 1 |   | <b>Charadriiformes</b>           |                              | 40                         |
|   | 1 | <b>Charadriidae</b>              |                              | 41                         |
|   | 1 | <i>Vanellus chilensis</i>        | quero-quero                  | Southern Lapwing           |
| 1 |   | <b>Pelecaniformes</b>            |                              | 43                         |
|   | 1 | <b>Ardeidae</b>                  |                              | 44                         |
|   | 1 | <i>Nycticorax nycticorax</i>     | socó-dorminhoco              | Black-crowned Night-Heron  |
|   | 1 | <i>Butorides striata</i>         | socozinho                    | Striated Heron             |
|   | 1 | <i>Ardea alba</i>                | garça-branca-grande          | Great Egret                |
|   | 1 | <i>Syrigma sibilatrix</i>        | maria-faceira                | Whistling Heron            |
|   | 1 | <i>Egretta thula</i>             | garça-branca-pequena         | Snowy Egret                |
|   | 1 | <b>Threskiornithidae</b>         |                              | 50                         |
|   | 1 | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | coró-coró                    | Green Ibis                 |
| 1 |   | <b>Cathartiformes</b>            |                              | 52                         |
|   | 1 | <b>Cathartidae</b>               |                              | 53                         |
|   | 1 | <i>Coragyps atratus</i>          | urubu-preto                  | Black Vulture              |
|   | 1 | <i>Cathartes aura</i>            | urubu-de-cabeça-vermelha     | Turkey Vulture             |
| 1 |   | <b>Accipitriformes</b>           |                              | 56                         |
|   | 1 | <b>Accipitridae</b>              |                              | 57                         |
|   | 1 | <i>Leptodon cayanensis</i>       | gavião-gato                  | Gray-headed Kite           |
|   | 1 | <i>Spizaetus tyrannus</i>        | gavião-pega-macaco           | Black Hawk-Eagle           |

|   |   |                                |                               |                           |    |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----|
|   | 1 | <i>Accipiter striatus</i>      | tauató-miúdo                  | Sharp-shinned Hawk        | 60 |
|   | 1 | <i>Rupornis magnirostris</i>   | gavião-carijó                 | Roadside Hawk             | 61 |
|   | 1 | <i>Buteo brachyurus</i>        | gavião-de-cauda-curta         | Short-tailed Hawk         | 62 |
| 1 |   | <b>Strigiformes</b>            |                               |                           | 63 |
|   | 1 | <b>Strigidae</b>               |                               |                           | 64 |
|   | 1 | <i>Megascops choliba</i>       | corujinha-do-mato             | Tropical Screech-Owl      | 65 |
|   | 1 | <i>Asio clamator</i>           | coruja-orelhuda               | Striped Owl               | 66 |
| 1 |   | <b>Trogoniformes</b>           |                               |                           | 67 |
|   | 1 | <b>Trogonidae</b>              |                               |                           | 68 |
|   | 1 | <i>Trogon surrucura</i>        | surucuá-variado               | Surucua Trogon            | 69 |
| 1 |   | <b>Piciformes</b>              |                               |                           | 70 |
|   | 1 | <b>Ramphastidae</b>            |                               |                           | 71 |
|   | 1 | <i>Ramphastos toco</i>         | tucanuçu                      | Toco Toucan               | 72 |
|   | 1 | <i>Ramphastos vitellinus</i>   | tucano-de-bico-preto          | Channel-billed Toucan     | 73 |
|   | 1 | <i>Ramphastos dicolorus</i>    | tucano-de-bico-verde          | Red-breasted Toucan       | 74 |
|   | 1 | <b>Picidae</b>                 |                               |                           | 75 |
|   | 1 | <i>Picumnus temminckii</i>     | picapauzinho-de-coleira       | Ochre-collared Piculet    | 76 |
|   | 1 | <i>Melanerpes candidus</i>     | pica-pau-branco               | White Woodpecker          | 77 |
|   | 1 | <i>Veniliornis spilogaster</i> | pica-pau-verde-carijó         | White-spotted Woodpecker  | 78 |
|   | 1 | <i>Dryocopus lineatus</i>      | pica-pau-de-banda-branca      | Lineated Woodpecker       | 79 |
|   | 1 | <i>Celeus flavescens</i>       | pica-pau-de-cabeça-amarela    | Blond-crested Woodpecker  | 80 |
|   | 1 | <i>Colaptes melanochloros</i>  | pica-pau-verde-barrado        | Green-barred Woodpecker   | 81 |
|   | 1 | <i>Colaptes campestris</i>     | pica-pau-do-campo             | Campo Flicker             | 82 |
| 1 |   | <b>Falconiformes</b>           |                               |                           | 83 |
|   | 1 | <b>Falconidae</b>              |                               |                           | 84 |
|   | 1 | <i>Caracara plancus</i>        | carcará                       | Crested Caracara          | 85 |
|   | 1 | <i>Milvago chimachima</i>      | carrapateiro                  | Yellow-headed Caracara    | 86 |
|   | 1 | <i>Falco sparverius</i>        | quiriquiri                    | American Kestrel          | 87 |
|   | 1 | <i>Falco femoralis</i>         | falcão-de-coleira             | Aplomado Falcon           | 88 |
| 1 |   | <b>Psittaciformes</b>          |                               |                           | 89 |
|   | 1 | <b>Psittacidae</b>             |                               |                           | 90 |
|   | 1 | <i>Brotogeris tirica</i>       | periquito-rico                | Plain Parakeet            | 91 |
|   | 1 | <i>Brotogeris chiriri</i>      | periquito-de-encontro-amarelo | Yellow-chevroned Parakeet | 92 |
|   | 1 | <i>Pionus maximiliani</i>      | maitaca-verde                 | Scaly-headed Parrot       | 93 |

|   |   |                                     |                                 |                                |     |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 1 | <i>Amazona aestiva</i>              | papagaio-verdadeiro             | Turquoise-fronted Parrot       | 94  |
|   | 1 | <i>Forpus xanthopterygius</i>       | tuim                            | Blue-winged Parrotlet          | 95  |
|   | 1 | <i>Pyrrhura frontalis</i>           | tiriba-de-testa-vermelha        | Maroon-bellied Parakeet        | 96  |
|   | 1 | <i>Diopsittaca nobilis</i>          | maracanã-pequena                | Red-shouldered Macaw           | 97  |
|   | 1 | <i>Psittacara leucophthalmus</i>    | periquitão                      | White-eyed Parakeet            | 98  |
|   |   | <b>Passeriformes</b>                |                                 |                                | 99  |
| 1 | 1 | <b>Thamnophilidae</b>               |                                 |                                | 100 |
|   | 1 | <i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> | chorozinho-de-asa-vermelha      | Southern Rufous-winged Antwren | 101 |
|   | 1 | <i>Thamnophilus caerulescens</i>    | choca-da-mata                   | Variable Antshrike             | 102 |
|   | 1 | <i>Hypodaleus guttatus</i>          | chocão-carijó                   | Spot-backed Antshrike          | 103 |
|   | 1 | <b>Conopophagidae</b>               |                                 |                                | 104 |
|   | 1 | <i>Conopophaga lineata</i>          | chupa-dente                     | Rufous Gnateater               | 105 |
|   | 1 | <b>Dendrocolaptidae</b>             |                                 |                                | 106 |
|   | 1 | <i>Sittasomus griseicapillus</i>    | arapaçu-verde                   | Olivaceous Woodcreeper         | 107 |
|   | 1 | <i>Dendrocolaptes platyrostris</i>  | arapaçu-grande                  | Planalto Woodcreeper           | 108 |
|   | 1 | <i>Xiphocolaptes albicollis</i>     | arapaçu-de-garganta-branca      | White-throated Woodcreeper     | 109 |
|   | 1 | <i>Xiphorhynchus fuscus</i>         | arapaçu-rajado                  | Lesser Woodcreeper             | 110 |
|   | 1 | <b>Furnariidae</b>                  |                                 |                                | 111 |
|   | 1 | <i>Furnarius rufus</i>              | joão-de-barro                   | Rufous Hornero                 | 112 |
|   | 1 | <i>Lochmias nematura</i>            | joão-porca                      | Sharp-tailed Streamcreeper     | 113 |
|   | 1 | <i>Syndactyla rufosuperciliata</i>  | trepador-quiete                 | Buff-browed Foliage-gleaner    | 114 |
|   | 1 | <i>Cranioleuca pallida</i>          | arredio-pálido                  | Pallid Spinetail               | 115 |
|   | 1 | <i>Synallaxis ruficapilla</i>       | pichororé                       | Rufous-capped Spinetail        | 116 |
|   | 1 | <i>Synallaxis spixi</i>             | joão-teneném                    | Spix's Spinetail               | 117 |
|   | 1 | <b>Cotingidae</b>                   |                                 |                                | 118 |
|   | 1 | <i>Pyroderus scutatus</i>           | pavó                            | Red-ruffed Fruitcrow           | 119 |
|   | 1 | <i>Procnias nudicollis</i>          | araponga                        | Bare-throated Bellbird         | 120 |
|   | 1 | <b>Tityridae</b>                    |                                 |                                | 121 |
|   | 1 | <i>Tityra inquisitor</i>            | anambé-branco-de-bochecha-parda | Black-crowned Tityra           | 122 |
|   | 1 | <i>Pachyramphus validus</i>         | caneleiro-de-chapéu-preto       | Crested Becard                 | 123 |
|   | 1 | <i>Tolmomyias sulphureus</i>        | bico-chato-de-orelha-preta      | Yellow-olive Flycatcher        | 124 |
|   | 1 | <i>Todirostrum cinereum</i>         | ferreirinho-relógio             | Common Tody-Flycatcher         | 125 |
|   | 1 | <b>Tyrannidae</b>                   |                                 |                                | 126 |
|   | 1 | <i>Hirundinea ferruginea</i>        | gibão-de-couro                  | Cliff Flycatcher               | 127 |



|   |                                |                                  |                                 |     |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| 1 | <i>Camptostoma obsoletum</i>   | risadinha                        | Southern Beardless-Tyrannulet   | 128 |
| 1 | <i>Pitangus sulphuratus</i>    | bem-te-vi                        | Great Kiskadee                  | 129 |
| 1 | <i>Myiodynastes maculatus</i>  | bem-te-vi-rajado                 | Streaked Flycatcher             | 130 |
| 1 | <i>Megarynchus pitangua</i>    | neinei                           | Boat-billed Flycatcher          | 131 |
| 1 | <i>Myiozetetes similis</i>     | bentevizinho-de-penacho-vermelho | Social Flycatcher               | 132 |
| 1 | <i>Tyrannus melancholicus</i>  | suiriri                          | Tropical Kingbird               | 133 |
| 1 | <i>Tyrannus savana</i>         | tesourinha                       | Southern Fork-tailed Flycatcher | 134 |
| 1 | <i>Empidonomus varius</i>      | peitica                          | Variegated Flycatcher           | 135 |
| 1 | <i>Fluvicola nengeta</i>       | lavadeira-mascarada              | Masked Water-Tyrant             | 136 |
| 1 | <i>Myiophobus fasciatus</i>    | filipe                           | Bran-colored Flycatcher         | 137 |
| 1 | <i>Lathrotriccus euleri</i>    | enferrujado                      | Euler's Flycatcher              | 138 |
| 1 | <i>Xolmis velatus</i>          | noivinha-branca                  | White-rumped Monjita            | 139 |
| 1 | <b>Vireonidae</b>              |                                  |                                 | 140 |
| 1 | <i>Cyclarhis gujanensis</i>    | pitiguari                        | Rufous-browed Peppershrike      | 141 |
| 1 | <i>Hylophilus poicilotis</i>   | verdinho-coroado                 | Rufous-crowned Greenlet         | 142 |
| 1 | <i>Vireo chivi</i>             | juruviara                        | Chivi Vireo                     | 143 |
| 1 | <b>Corvidae</b>                |                                  |                                 | 144 |
| 1 | <i>Cyanocorax chrysops</i>     | gralha-picaça                    | Plush-crested Jay               | 145 |
| 1 | <i>Cyanocorax cyanopogon</i>   | gralha-cancã                     | White-naped Jay                 | 146 |
| 1 | <b>Hirundinidae</b>            |                                  |                                 | 147 |
| 1 | <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | andorinha-pequena-de-casa        | Blue-and-white Swallow          | 148 |
| 1 | <b>Troglodytidae</b>           |                                  |                                 | 149 |
| 1 | <i>Troglodytes musculus</i>    | corruíra                         | Southern House Wren             | 150 |
| 1 | <b>Turdidae</b>                |                                  |                                 | 151 |
| 1 | <i>Turdus flavipes</i>         | sabiá-una                        | Yellow-legged Thrush            | 152 |
| 1 | <i>Turdus leucomelas</i>       | sabiá-barranco                   | Pale-breasted Thrush            | 153 |
| 1 | <i>Turdus rufiventris</i>      | sabiá-laranjeira                 | Rufous-bellied Thrush           | 154 |
| 1 | <i>Turdus amaurochalinus</i>   | sabiá-poca                       | Creamy-bellied Thrush           | 155 |
| 1 | <b>Mimidae</b>                 |                                  |                                 | 156 |
| 1 | <i>Mimus saturninus</i>        | sabiá-do-campo                   | Chalk-browed Mockingbird        | 157 |
| 1 | <b>Passeridae</b>              |                                  |                                 | 158 |
| 1 | <i>Passer domesticus</i>       | pardal                           | House Sparrow                   | 159 |
| 1 | <b>Fringillidae</b>            |                                  |                                 | 160 |
| 1 | <i>Spinus magellanicus</i>     | pintassilgo                      | Hooded Siskin                   | 161 |

|   |                                  |                           |                           |     |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| 1 | <b>Passerellidae</b>             |                           |                           | 162 |
| 1 | <i>Zonotrichia capensis</i>      | tico-tico                 | Rufous-collared Sparrow   | 163 |
| 1 | <b>Icteridae</b>                 |                           |                           | 164 |
| 1 | <i>Molothrus bonariensis</i>     | chupim                    | Shiny Cowbird             | 165 |
| 1 | <i>Gnorimopsar chopi</i>         | pássaro-preto             | Chopi Blackbird           | 166 |
| 1 | <b>Parulidae</b>                 |                           |                           | 167 |
| 1 | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | pia-cobra                 | Masked Yellowthroat       | 168 |
| 1 | <i>Setophaga pitaiyumi</i>       | mariquita                 | Tropical Parula           | 169 |
| 1 | <i>Myiothlypis leucoblephara</i> | pula-pula-assobiador      | White-browed Warbler      | 170 |
| 1 | <i>Basileuterus culicivorus</i>  | pula-pula                 | Golden-crowned Warbler    | 171 |
| 1 | <b>Cardinalidae</b>              |                           |                           | 172 |
| 1 | <i>Habia rubica</i>              | tiê-de-bando              | Red-crowned Ant-Tanager   | 173 |
| 1 | <b>Thraupidae</b>                |                           |                           | 174 |
| 1 | <i>Dacnis cayana</i>             | saí-azul                  | Blue Dacnis               | 175 |
| 1 | <i>Saltator similis</i>          | trinca-ferro              | Green-winged Saltator     | 176 |
| 1 | <i>Coereba flaveola</i>          | cambacica                 | Bananaquit                | 177 |
| 1 | <i>Trichothraupis melanops</i>   | tiê-de-topete             | Black-goggled Tanager     | 178 |
| 1 | <i>Tachyphonus coronatus</i>     | tiê-preto                 | Ruby-crowned Tanager      | 179 |
| 1 | <i>Sporophila caerulescens</i>   | coleirinho                | Double-collared Seedeater | 180 |
| 1 | <i>Thlypopsis sordida</i>        | saí-canário               | Orange-headed Tanager     | 181 |
| 1 | <i>Conirostrum speciosum</i>     | figuinha-de-rabo-castanho | Chestnut-vented Conebill  | 182 |
| 1 | <i>Sicalis flaveola</i>          | canário-da-terra          | Saffron Finch             | 183 |
| 1 | <i>Pipraeidea melanonota</i>     | saíra-viúva               | Fawn-breasted Tanager     | 184 |
| 1 | <i>Thraupis sayaca</i>           | sanhaço-cinzento          | Sayaca Tanager            | 185 |
| 1 | <i>Thraupis palmarum</i>         | sanhaço-do-coqueiro       | Palm Tanager              | 186 |
| 1 | <i>Stelpnia cayana</i>           | saíra-amarela             | Burnished-buff Tanager    | 187 |
| 1 | <i>Tangara desmaresti</i>        | saíra-lagarta             | Brassy-breasted Tanager   | 188 |

17 39 132

**Legenda:**

O: Ordem

F: Família

E: espécie

FABIO FERRAO

VIDEIRA:14390708813

Assinado de forma digital por FABIO

FERRAO VIDEIRA:14390708813

Dados: 2023.07.05 14:59:11 -03'00'

| Visita | Número acumulado de espécies | Data, horário e tempo de observação                |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1      | 32                           | 21/1/2007, 5h de observação.                       |
| 2      | 51                           | 11/3/2007, 7h de observação.                       |
| 3      | 60                           | 17/11/2007, 3h de observação.                      |
| 4      | 67                           | 15/3/2008, 5h30min de observação.                  |
| 5      | 75                           | 16/8/2008, 7h30min de observação.                  |
| 6      | 84                           | 25/1/2009, 3h30min + registros esporádicos.        |
| 7      | 96                           | 17/09/2011, 7h + registros esporádicos.            |
| 8      | 103                          | 24/11/2012, 7h + registros esporádicos.            |
| 9      | 108                          | 10/08/2013, 6h + registros esporádicos.            |
| 10     | 111                          | 28/03/2014, 3h de observação noturna.              |
| 11     | 121                          | Registros esporádicos + registros com câmera Trap. |
| 12     | 132                          | Registros esporádicos + o vídeo da Cavalaria.      |

**Total de ordens: 17**  
**Total de famílias: 39**  
**Total de espécies: 132**

